

فايكنو جنت - 5 %

محلول للحقن

للمجترات والخيول والكلاب والقطط والخنزير والدواجن

التركيب: كل مل يحتوي على:

50 ملغم جنتاميسين (كبريتات الجنتاميسين)

الخواص:

- يتميز الصاد الحيوي جنتاميسين (مجموعة امينوجلايكوسايد) بفعاليتها الواسعة الطيف و القوية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية والإيجابية : الكولاي والسالمونيلا والباستريلا والليستريا والفيبريو والمكورات العنقودية والعقدية والبسودوموناس والاريسيلوثريكس وغيرها .
- يتم امتصاصه بسرعة من موقع الحقن مع بقاءه في الدم والأنسجة لمدة 12-24 ساعة، وبسبب إطراره دون أن يطرأ عليه أية تغيرات من خلال الكلى مما يجعل تركيزه عالياً في الجهاز البولي.

الاستطبايات:

- للمجترات والخيول والكلاب والقطط والخنزير والدواجن.
- إصابات الجهاز التنفسي: الالتهاب الرئوي والقصبات والشعب الهوائية.
- إصابات الجهاز الهضمي: التهاب المعدة والبريتون والنزلات المعوية والإسهالات العادية والمدممة وزحار الفيبريو.
- إصابات الجهاز البولي: التهاب الكلى والحالب والمثانة.
- إصابات الجهاز التناسلي: التهاب الرحم وعنق الرحم، والتهاب الضرع (كعلاج داعم).
- التسمم الدموي والتهاب المفاصل واصابات الجلد والجروح.
- وقاية المواليد الجدد والحيوانات الصغيرة والمفاطم من النفوق المبكر وكذلك الصيصان الفاقسة حديثاً.

الجرعات: (يعطى حقناً بالعضل أو تحت الجلد أو بالنقع داخل الرحم).

الحقن بالعضل:

- المجترات والخيول: 2-4 مل / 50 كغم وزن جسم.
- الكلاب والقطط والخنزير: 1 مل / 10 كغم وزن جسم.
- تعطى جرعتان في اليوم الأول، ثم مرة واحدة يومياً ولمدة أسبوع.
- الحقن تحت الجلد (بالرقبة):
- الصيصان عمر يوم واحد: يخفف العلاج بالماء أو بمحلول الملح الفسيولوجي المعقمين بنسبة (100:1) ثم يحقن 0.4 مل لكل صوص.
- صيصان الحبش (الرومي) عمر (1-3) يوم: يخفف العلاج بالماء أو بمحلول الملح الفسيولوجي المعقمين بنسبة (20:1) ثم يحقن 0.4 مل لكل صوص حبش.
- للدواجن مع ماء الشرب: 2 مل / لتر لمدة 4-5 أيام.
- الجرعة بالنقع داخل الرحم (حالات التهاب الرحم وعنقه):
- الأبقار: 4 مل مرة يومياً مخففة مع 20-50 مل من محلول الملح الفسيولوجي المعقم.
- الأفراس: 40-50 مل يومياً مخففة مع 200-500 مل من محلول الملح الفسيولوجي المعقم ولمدة 3-5 أيام.
- في حالة التهاب الرحم الصددي، يجب تنظيف الرحم أولاً من الافرازات الصدديية قبل المعالجة.
- لا يستعمل يوم إجراء الشبا للأفراس.

فترة الأمان:

- لإستهلاك اللحوم: 45 يوماً.
- لإستهلاك الحليب: ثلاثة أيام.

تنبيهات:

- لا يعطى مع مستحضرات التخدير أو التي تسبب ارتخاء العضلات أو مستحضرات الأمينو جلايكوسيد الأخرى أو مستحضرات البوليمكسين (الكوليستين).
- لا يعطى في حالات إضطراب الكلى.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.