

فلونيكسيفاب (محلول للحقن)

للحقن بالوريد أو بالعضل في الخيل
للحقن بالوريد في الأبقار

التركيب:

كل مل يحتوي على:

فلونكسين ميجلومين (فلونكسين) 50 ملغم.

الإستطبابات:

الخيـل : ينصح باستعمال فلونيكسيفاب لتسكين الالتهابات والألام المصاحبة لأي خلل عضلي (عرج، التهاب مفاصل ... الخ) والمغص المعوي.

الأبقار : ينصح باستعماله لخفض الحرارة في حالات الالتهابات الحادة.

الجرعات:

الخيـل :

■ ألام العضلات

- 1.1 ملغم / كغم من وزن الجسم (1 مل / 45 كغم) مرة واحدة يوميا.
- يمكن حقنهم عضليا أو في الوريد وتعاد لمدة (5 أيام).

■ بالنسبة لحالات المغص

- 1.1 ملغم / كغم من وزن الجسم حقن في الوريد لتخفيف الألام في الحال، يمكن اعادة العلاج لو ظهرت أعراض المغص مرة ثانية.

الأبقار:

ينصح بحقن 2.2 ملغم / كغم (2 مل / 45 كغم) لخفض الحرارة في حالات الالتهابات الحادة ويفضل الحقن في الوريد بحيث يتم تحديد سبب الالتهاب الحاد وعلاجه بالعلاج المرافق المناسب.

تحذيرات :

لا توجد اي اعراض جانبية لهذا المستحضر إذا استعمل حسب التعليمات ويجب تجنب الحقن في الشريان في الخيول والأبقار. فإذا تم حقن الخيول سهوا في الشريان يمكن أن تظهر رد فعل عكسي.

أعراض مثل التشنجات وضعف في العضلات، لكن هذه الأعراض تكون لحظية وتختفي بدون أي علاج مضاد.

الأحتياطات :

- يجب عدم خلط فلونيكسيفاب مع أي مستحضر آخر في نفس الحقنة.

فترة سحب العلاج :

- الحليب: 24 ساعة.
- اللحوم: 10 أيام بعد آخر جرعة.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من 30 ° م

للاستعمال البيطري فقط.