

المجموعة:
Imidazolinone

ايمازافاب - ١٢٪

مبيد عشبي / مركز قابل للذوبان



مبيد عشبي جهازي يمتص عن طريق المجموع الخضري كما انه يمتص عن طريق الجذور يستعمل لمكافحة مجموعة كبيرة من الاعشاب على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل لتر يحتوي على:

ايمازاموكس ١٢٪ و/ح (مادة فعالة)

الخواص :

ايمازافاب - ١٢٪ : مبيد عشبي جهازي، اختياري يمتص عن طريق المجموع الخضري كما انه يمتص عن طريق الجذور، يستعمل لمكافحة مجموعة كبيرة من الأعشاب على عدد كبير من المحاصيل الزراعية.

ايمازافاب - ١٢٪ : مبيد عشبي يستعمل بعد الانبات للسيطرة على العديد من الاعشاب عريضة الاوراق والاعشاب الرفيعة.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	الجرعة / دونم	موعد التطبيق	ملاحظات
البرسيم	الأعشاب عريضة الاوراق مثل: (الرجلة، الجويسة، اللبالب الأسود، كف السبع، خرق البحر، عشبة أبرة العجوز، قش الفراش، الحنطة البرية السوداء، عشبة الحوذان، العشب الخشن، عشبة جسمون، مصاله، رجل الأوز، عشبة الخبيزة البرية، المشقة، الخردل الأسود، عكوب الجبلي، الصفصاف، عشبة الخنازير، القصب الذهبي، عشبة أبو طيلون، الهندباء البرية، الحماض الأصفر، أمستيكية، الجيرانيوم، عشبة الحاشكي، عشبة السبانخ، عشبة عنب الثوب، عشبة كيس الراعي)	٢٨ - ٤٢ مل	يطبق بوقت مبكر بعد الانبات عندما تنمو الاعشاب بنشاط وقبل ان يتجاوز طول العشب ٧ سم، ويطبق على الشتلات أو البرسيم الذي يزرع من اجل العلف أو التبن أو البذور. شتلات البرسيم: يطبق في المرحلة الثانية ثلاثية الاوراق أو أكبر عندما تكون غالبية الحشائش بطول ٣ - ٧ سم، قبل تكوين البراعم. البرسيم المزروع: يطبق في الخريف أو الشتاء أو الربيع على البرسيم الحجازي الخامل أو شبه الخامل، ويطبق قبل نمو البرسيم أو إعادة نموه بشكل ملحوظ.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يطبق بشكل متسلسل لمنتجات imazethapyr متبوعة بـ Imazavap-12٪ خلال ٦٠ يوماً بسبب زيادة إمكانية استجابة محصول البرسيم
الهندباء البرية	عشبة الخنازير، القصب الذهبي، عشبة أبو طيلون، الهندباء البرية، الحماض الأصفر، أمستيكية، الجيرانيوم، عشبة الحاشكي، عشبة السبانخ، عشبة عنب الثوب، عشبة كيس الراعي)	٢٨ مل	يطبق بوقت مبكر بعد الانبات عندما تنمو الاعشاب بنشاط وقبل أن يتجاوز ارتفاعها ٧ سم. يطبق عندما يكون لدى الهندباء ما لا يقل عن ٢، وليس أكثر من ٤ أوراق حقيقية ممتدة بالكامل.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يطبق في ظروف الاجهاد، أضرار البرد، الجفاف، أو الضرر من مبيدات عشبية أخرى، أو التقلب في درجات الحرارة.
البرسيم لغير الأغذية و لغير العلف	عشبة الخنازير، القصب الذهبي، عشبة أبو طيلون، الهندباء البرية، الحماض الأصفر، أمستيكية، الجيرانيوم، عشبة الحاشكي، عشبة السبانخ، عشبة عنب الثوب، عشبة كيس الراعي)	٢٨ - ٣٥ مل	يطبق بوقت مبكر بعد الانبات عندما يحتوي البرسيم على ورقتين على الأقل، وعندما يكون طول غالبية الأعشاب من ٣ إلى ٧ سم.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يستخدم للبرسيم المخصص للبذور.
البرسيم للبدور	الأعشاب رفيعة الاوراق مثل: (أعشاب بيرنارد، عشبة الثعلبية، عشبة السورغوم، عشبة ذيل الثعلب العملاق، عشبة الدوسر، عشبة الشويعرة)	٣٥ مل	يطبق بوقت مبكر بعد الانبات عندما يحتوي البرسيم على ورقتين على الأقل، وعندما يكون طول غالبية الأعشاب من ٣ إلى ٧ سم، يفضل إضافة مادة مساعدة خافض للتوتر السطحي غير أيوني، أو مركز زيت محمول أو تركيز زيت عالي الفاعل بالسلمج، وسماد نيتروجين.	- التطبيق يكون قبل أزهار البرسيم. - لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - في حالة حدوث حالة قاحلة خلال سنة التطبيق، فقد تحدث إصابة دورانية للمحصول. - لا يطبق في ظروف الاجهاد، أضرار البرد، الجفاف، أو الضرر من مبيدات عشبية أخرى، أو التقلب في درجات الحرارة.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الأعشاب	الجرعة / دونم	موعد التطبيق	ملاحظات
الفاصولياء الجافة، البازيلاء الجافة	الأعشاب عريضة الأوراق مثل: (الرجلة، الجويسة، اللبلاب الأسود، كف السبع، خرق البحر، عشبة أبرة العجز، قش الفرأش، الحنطة البرية السوداء، عشبة الحوذان، العشب الخشن، ، عشبة جيمسون، مصاله، رجل الأوز، عشبة الخبيزة البرية، العنقفة، الخردل الأسود، عكوب الجبلي، الصفصاف، عشبة الخنازير، القصب الذهبي، عشبة أبو ميطون، الهندباء البرية، الحماض الأصفر، أمسنيكية، الجيرانيوم، عشبة الحاكشي، عشبة السبانخ، عشبة عنب الذئب، عشبة كيس الراعي)	٢٨ مل	يطبق بعد الانبات قبل مرحلة الأزهار، لكن بعد ان تكون الفاصوليا الجافة تحتوي على ما لا يقل عن ورقة واحدة ثلاثية الأوراق ممتدة بالكامل، وتحتوي البازلاء الجافة على ٣ أزواج من الأوراق على الأقل.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة.
فول الصويا الاخضر		٢٨ مل	يطبق بوقت مبكر بعد انبات المحصول وقبل ثلاثية الأوراق الرابعة عندما يكون طول الحشائش أقل من ٧ سم.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يطبق بعد بدء فترة الازهار للمحصول.
الفاصوليا البيضاء		٢٨ مل	يطبق بوقت مبكر بعد الانبات، يطبق مع بنتازون الصوديوم ، يطبق في المرحلة الأولى إلى الثانية من الأوراق ثلاثية الأوراق وعلى الأعشاب التي يقل ارتفاعها عن ٧ سم.	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يطبق خلال فترة الازهار.
الفاصوليا الخضراء		٢٨ مل	يطبق بعد الانبات، يطبق في المرحلة التي يكون فيها المحصول بورقة واحدة على الأقل ممددة بالكامل وقبل مرحلة الإزهار. ممزوج بصوديوم بنتازون لتقليل حساسية النبات	- لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة. - لا يطبق خلال فترة الازهار.
فول الصويا	الأعشاب رفيعة الأوراق مثل: (أعشاب بيرنارد، عشبة الثعلبية، عشبة السورغوم، عشبة ذيل الثعلب العملاق، عشبة الدوسر، عشبة الشويعرة)	٣٥ مل	يطبق بعد الانبات في برنامج مكافحة الأعشاب.	- يطبق قبل فترة أزهار المحصول. - لا يطبق أكثر من مرة واحدة في السنة.

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمال.
- لا يطبق في أي من أنظمة الري.
- لا تقم بتطبيق imazethapyr اذا تم إعادة زراعة فول الصويا (غير ناضج) او فول الصويا.
- التطبيق بعد الانبات يتطلب إضافة مواد مساعدة او سماد نيتروجيني.
- قم بالزراعة بعد ٧-١٠ أيام من تطبيق IMAZAVAP-12% SL بعد الانبات لتحسين مكافحة الأعشاب.
- يطبق قبل هطول الامطار او الري العلوي بساعه.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤ ساعات على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع المبيدات الزراعية الأخرى .