

المجموعة:
PYRETHROID

دلتاسيز - ١٠٪

مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد حشري على شكل مركز قابل للاستحلاب ، يعمل عن طريق الملامسة والمعدة فعال في مكافحة الآفات المدرجة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

دلتامثرين ١٠٪ و / ح (مادة فعالة)

الخواص :

دلتاسيز - ١٠٪ : يمنع قنوات الصوديوم من الاغلاق ويؤدي الى فرط التهيج.

دلتاسيز - ١٠٪ : مبيد حشري غير جهازي نشط عن طريق الملامسة والمعدة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	ملاحظات الاستعمال	الحد الأعلى المسموح لكل ٤٠٠ لتر ماء / ٤ دونم	حجم محلول للتطبيق لكل ٤ دونم	فترة ما بين التطبيقين (أيام)	فترة الأمان (أيام)
الثوم، البصل الجاف، البصل الأخضر، الكراث	الديدان القارضة	٣،٤-٢،٢	---	٤٢٥ مل	١٩ لتر	٥	٣
	البق، التريس	٥،٣-٣،٤					
حقول الذرة	الديدان القارضة، الخنافس، النطاطات	٣،٤-٢،٢	يطبق عندما تكون البرقات في الطور المبكر.	٣٦٠ مل	١٩ لتر	٢١	٧
	دودة الحشد، البق، الخنافس، حفار الذرة الاوروبي،	٤،٣-٣،٤	لا تقم بأكثر من ٥ تطبيقات في الموسم الواحد				١٢ للرعي
	المن	٤،٣-٣،٤					
الذرة الحلوة	الديدان القارضة، الخنافس، النطاطات	٣،٤-٢،٢	قم بزيادة حجم المياه الى ما لا يقل عن ٩ لتر لكل فدان (٤ دونم) للتطبيقات الجوية وما لا يقل عن ٣٨ لتر من الماء لكل فدان (٤ دونم) للتطبيقات الأرضية لضمان تغطية شاملة.	٢١٨ مل	١٩ لتر	١	٣
	دودة الحشد، البق، الخنافس، حفار الذرة الاوروبي	٥،٣-٣،٤					لا ترعى الماشية في المناطق المعالجة خلال ٢٤ ساعة من اخر تطبيق على المحصول الطازج (الأخضر). لا تطعم الماشية في المناطق المعالجة في غضون ٢١ يوم من التطبيق
	المن	٥،٣-٣،٤					

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الأففة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	ملاحظات الاستعمال	الحد الأعلى المسموح لكل لتر ماء / ٤ دونم	حجم محلول التطبيق لكل ٤ دونم	فترة ما بين التطبيقين (أيام)	فترة الأمان (أيام)
القطن	نطاطات الأوراق، ثاقبة أوراق القطن، الديان القارضة، التريس	٣,٥-٢,٥	للحصول على أفضل تحكم قم بالتطبيق على يرقات الطور الأول والثاني. لا تستخدم أكثر من ٦ تطبيقات من المبيد في الموسم الواحد. لا يطبق كتطبيق متناهي الصغر ULV	٦٩٢ مل	١٩ لتر	٥	٢١
	دودة الحشد، حفار الذرة، الجنادب، البق النتن، دودة البراعم	٥,٨-٣,٥					
	المن، الحلم، الذبابة البيضاء	٥,٨-٣,٥					
الخيار، القرع، الشمام، الكنتالوب	لفافات الملفوف، الديان القارضة، نطاطات الأوراق	٥,١-٢,١٥	يطبق عندما تكون اليرقات في الطور المبكر.	٦١٤ مل	١٩ لتر	٣	٣
	الديان القارضة، الديان، الخنافس، عثة الظهر الماسي، الجنادب، دودة البطيخ، البق النتن، عثة ثمار البندورة	٥,١-٣,٣					
	من الدراق الأخضر، الذبابة البيضاء	٥,١-٣,٣					
الباذنجان، الفلفل، الطليفة، البندورة	لفافات الأوراق، نطاطات الأوراق، الديان	٥,١-٢,١٥	يطبق عندما تكون اليرقات في الطور المبكر.	٦١٤ مل	١٩ لتر	٥	٣
	الديان القارضة، الخنفساء البرغوثية، فراشة الملفوف، البق النتن، التريس، عثة ثمار البندورة	٥,١-٣,٣					
	المن، صانعات الانفاق، البق	٥,١-٣,٣					
الخرشوف	دودة الحشد، لفافات الملفوف، الخنافس البرغوثية، العث، البق	٥,١-٣,٣	يطبق عندما تكون اليرقات في الطور المبكر.	٥١١,٤ مل	١٩ لتر	٣	٣
	المن، صانعات الانفاق، البق	٥,١-٣,٣					

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الافقة	ملاحظات الاستعمال	الحد الأعلى المسموح لكل لتر ماء / ٤ دوئم	حجم محلول التطبيق لكل ٤ دوئم	فترة ما بين التطبيقين (أيام)	فترة الأمان (أيام)
الجزر، الكرفس، الهندباء، البنجر، الجينسنغ، اليقودونس، الجزر الأبيض، الفجل، البطاطا، البطاطا الحلوة، الزنجبيل، الكرکم	٥,١-٢,١٥	للفافات المفقوف، نطاطات الأوراق، عثة ثمار البندورة	٥١١,٤ مل	١٩ لتر	٣	٣
	٥,١-٣,٣	الديدان الفارضة، حفار الذرة الأوروبي، الخنفساء البرغوثية، فراشة المفقوف، البق النتن، التريس، عثة ثمار البندورة				
	٥,١-٣,٣	المن: صانعات الانفاق، الذبابة البيضاء				
الذرة الرفيعة	٣,٣-٢,١٥	الديدان الفارضة، الخنافس البرغوثية، الجناب	١٦٢ مل	١٩ لتر	٦	١٤
	٤,١-٢,٩	دودة الحشد، الخنافس، دودة جذر الذرة، حفار الذرة الأوروبي، حفار ساق الذرة الصغرى				
	٤,١-٣,٣	البق النتن				
	٤,١-٢,٩	المن				
اللوز، الجوز، الكاجو، الكستناء، الفستق	٦,٠-٣,٧	عثة التفاح، لفافات الأوراق، حفار الخفة، السوسة، البق النتن، ذبابة قشر الجوز، حفار الخوخ الغربي	٥٩٧ لتر	٩٥ لتر	٧	٢١
	٦,٠-٣,٧	المن				

تحذير :

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا تخلط المبيد أو تسمح بالتواصل مع العوامل المؤكسدة. قد يحدث تفاعل كيميائي خطير.
- تجنب التطبيقات أثناء ظروف الرياح العاتية.
- لا تستخدم أو تخزن بالقرب من حرارة أو لهب مفتوح.
- لا تستخدم هذا المنتج بطريقة من شأنها الاتصال بالعمال أو الأشخاص الآخرين.
- لا تطبق عندما تتجاوز سرعة الرياح ١٥ ميلا في الساعة في موقع التطبيق. تجنب التطبيقات أثناء ظروف الرياح العاتية.
- لا تطبق أثناء تداخلات درجة الحرارة.
- عند إجراء التطبيقات في الظروف الحارة والجافة ، استخدم قطرات أكبر لتقليل آثار التبخر.
- عند الإصابة الكثيفة يجب استعمال الجرعة الأعلى من المبيد.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

- لا تخلط المبيد أو تسمح بالتواصل مع العوامل المؤكسدة. قد يحدث تفاعل كيميائي خطير.
- قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة و ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.