

المجموعة:
Guanidine

دوديياب - ٧٠، ٤٠٪



مبيد فطري / مركز معلق

مبيد فطري لمكافحة عدد من الامراض الفطرية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل لتر يحتوي على:

٧٠، ٤٠٪ و / ح (مادة فعالة)

دوديين

الخواص :

دوديياب - ٧٠، ٤٠٪ : مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى.

دوديياب - ٧٠، ٤٠٪ : مبيد يستعمل لمكافحة مجموعة كبيرة من الامراض الفطرية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	جرعة الاستخدام ٢٠ / لتر ماء	موعد الاستعمال	ملاحظات	عدد مرات الرش بالموسم	الفترة بين الرشة والأخرى
الوزن، الكستناء	العفن البني (<i>Monilinia fructicola</i>)	٧١ مل	يستخدم عند البراعم الوردية، الازهار الكاملة وسقوط البتلات	- لا يستخدم بعد سقوط البتلات ب ٥ اسابيع.	٣ أيام	١٠ أيام
	الجرب (<i>Venturia carpophila anamorph</i>)	٧١ مل	يستخدم عند سقوط البتلات، ويمكن إعادة الرش كل ٢-٥ اسابيع			
	تنقب الأوراق (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	٧١ مل	يستخدم من مرحلة تفتح الأوراق الى سقوط البتلات، إعادة الرش كل ٢-٥ اسابيع			
	انثراكنوز (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	٧١ مل	يستخدم عند ظهور الأوراق الميدنية، إعادة الرش كل ١٠-١٤ يوم			
التفاح	الجرب (<i>Venturia inaequalis</i>)	٣٥ مل	يستخدم عند بداية ظهور البراعم الخضراء، ويطبق بشكل وقائى/اسبوعى من مرحلة البراعم الخضراء الى سقوط البتلات.	- لا يستخدم بعد سقوط البتلات.	٢ أيام	٧ أيام
الشمش، التنكرارين والدراق	تجدع الأوراق (<i>Taphrina deformans</i>)	٧١ مل	يستخدم في مرحلة السكون، ويمكن عمل تطبيقات اضافية قبل ان تفتح البراعم في الربيع.	- لا يستخدم بعد سقوط البتلات.	٣ أيام	٧ أيام
	العفن البني (<i>Monilinia fructicola</i>)	٧١ مل	يستخدم في البراعم الوردية، يعاد الرش عند الازهار الكامل ومرة اخرى عند سقوط البتلات			
	الجرب (<i>Venturia carpophila anamorph</i>)	٧١ مل	يستخدم عند سقوط البتلات.			
	تنقب الأوراق (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	٧١ مل	يستخدم في مرحلة السكون، يعاد الرش عند سقوط البتلات			

المحصول	الممرض	جرعة الاستخدام / ٢٠ لتر ماء	موعد الاستعمال	ملاحظات	عدد مرات الرش بالموسم	الفترة بين الرشة والأخرى
الموز	تبقع الأوراق	٢٠-٣٦ مل	تطبيق جوي	---	٥ أيام	١٥-٧ يوم
الكاجو، البنندق والجوز	العفن البني (<i>Monilinia fructicola</i>)	٧١ مل	يستخدم عند البراعم الوردية، الازهار الكاملة وسقوط البتلات	- لا يستخدم خلال ٣ ايام من الحصاد. - لا تستخدمه عندما تكون درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية، لأنها قد تسبب بقعا على أوراق الشجر أو الفاكهة	٣ أيام	١٠-١٤ يوم
	الجرب (<i>Venturia inaequalis</i>)	٧١ مل	يستخدم عند سقوط البتلات، يعاد الرش كل ٢-٥ اسابيع			
	تنقب الأوراق (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	٧١ مل	يستخدم عند ظهور الاوراق (ما بين الازهار وسقوط البتلات)، يعاد الرش كل ٣-٥ اسابيع			
	انثراكنوز (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	٧١ مل	يستخدم عند ظهور الورقة الاولى، يعاد الرش كل ١٠-١٤ يوم.			
الكرز	تبقع الأوراق (<i>Blumeriella jaapii anamorph</i>)	٣٥-٧١ مل	يستخدم عند سقوط البتلات او عند ظهور الاوراق الاولى، يعاد الرش كل ٧-١٠ أيام	- لا يستخدم خلال ٧ ايام من الحصاد. - لا تستخدمه عندما تكون درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية، لأنها قد تسبب بقعا على أوراق الشجر أو الفاكهة	٢ يوم	٧-١٠ أيام
	العفن البني (<i>Monilinia fructicola</i>)	٧١ مل	يستخدم في الوقت الذي تبدأ فيه براعم الزهور بالتفتح (مراحل إزهار البراعم البيضاء - بداية تكون الثمار).. يعاد الرش عند الإزهار الكامل ومرة أخرى عند سقوط البتلة			
الفول السوداني	تبقع الأوراق المبكر (<i>Cercospora arachidicola</i>) تبقع الأوراق المتأخر (<i>Cercosporidium Personatum</i>)	٢١-٣٥ مل	يتم تطبيقه بعد ٣٥ يوم من الزراعة، يعاد الرش كل ١٠-١٤ يوم	- لا يستخدم خلال ١٤ يوم من الحصاد. - لا تطعم الفول السوداني للماشية.	٥ أيام	١٠-١٤ يوم
الأجاص	الجرب (<i>Venturia pinna</i>) تبقع الاوراق (<i>Fabraea spp</i>)	٧١ مل	يطبق عند بدء ظهور البراعم الخضراء	- لا يستخدم خلال ٧ ايام من الحصاد.	٣ أيام	٧ أيام
الخوخ	تجدد الاوراق (<i>Taphrina deformans</i>)	٧١ مل	يستخدم في مرحلة السكون، ويمكن عمل تطبيقات اضافية قبل ان تفتح البراعم في الربيع.	- لا يستخدم خلال ٧ ايام من الحصاد.	٣ أيام	٧ أيام
	العفن البني (<i>Monilinia fructicola</i>)	٧١ مل	يستخدم في البراعم الوردية، يعاد الرش عند الازهار الكامل ومرة اخرى عند سقوط البتلات			
	الجرب (<i>Venturia carpophila anamorph</i>)	٧١ مل	يستخدم عند سقوط البتلات، يعاد الرش كل ٢-٥ اسابيع			
	تنقب الأوراق (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	٧١ مل	يستخدم في مرحلة السكون، يعاد الرش عند سقوط البتلات.			

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمال مع الالتزام بفترات تطبيق المبيد.
- لا يستخدم داخل البيوت البلاستيكية.
- لا يستخدم عن طريقة أنظمة الري.
- يمنع دخول الماشية الى الحقول والمناطق المعاملة.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع المبيدات الحشرية، الفطرية العشبية والحلم، غير قابل للخلط مع النحاس، الزيوت، الاسمدة الورقية ومادة الكلوربيريفوس، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.