



زنك-بروفاب ماكس

سماد نباتي / مركز معلق

التركيب: كل لتر يحتوي على:

زنك ٧٠٪ و/ح (مادة فعالة)

زنك

الخواص:

زنك-بروفاب ماكس: يستخدم لتعويض نقص عنصر الزنك في المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

زنك-بروفاب ماكس: يطبق بشكل وقائي أو عند ظهور اعراض النقص على النبات.

زنك-بروفاب ماكس: يتم تطبيقه عن طريق الرش الورقي.

الاستعمالات: عن طريق الرش الورقي

المحصول	نسبة الاستعمال	ملاحظات
التفاح، الاجاص	١٠٠ مل لكل لتر ماء / دونم	يطبق المنتج عند بداية تفتح البراعم وفي نهاية الازهار. تجنب الرش على الازهار. يتم إعادة التطبيق بعد الحصاد ولكن قبل سقوط الاوراق
الكرنب	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	عند مرحلة ٩-٤ اوراق
الجزر	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	عندما يصل النبات لطول ١٥ سم في حالة النقص الشديد، يمكن تكرار التطبيق بنفس المعدل كل ١٤ يوم
الحبوب	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	من مرحلة ورقتين الى العقد الاول
الكرز والخوخ	١٠٠ مل لكل لتر ماء / دونم	يتم تطبيقه عند البرعم الشتوى او البرعم الوردي ويتم التطبيق مرة اخرى بعد الحصاد ولكن قبل سقوط البذلة
أشجار المخروطيات	١٠٠ مل لكل ١٠٠-٥٠ لتر ماء / دونم	يتم عمل تطبيقات متعدلة في الموسم الجديد ومرة اخرى في أوائل الخريف
الكراث في الحقل	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	بعد ١٤ يوم من الزراعة او في مكان الزراعة المباشرة عندما يصل طول المحصول الى ١٥ سم.
الذرة	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	يتم عمل تطبيقات متكرر عن الصدورة بينهم فترة تتراوح بين ١٤-١٠ يوم في مرحلة من ٨-٣ اوراق وفي حالة النقص الشديد يمكن تكرار التطبيق كل ١٠ الى ١٤ يوم.
البصل في الحقل	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	عندما يكون هناك اوراق كافية للتلقى الرذاذ.
البطاطا	١٠٠ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	بعد أسبوع من الانبات الكامل ويمكن تكرار التطبيق عند الصدورة بنفس المعدل على فترات ١٤-١٠ يوم في حالة النقص المتوسط إلى الشديد عند البراعم الخضراء
التوت	٥٥ مل لكل ٢٠ لتر ماء / دونم	يتم عمل تطبيق واحد عند ظهور البراعم الخضراء ويتم عمل التطبيقات التالية عند البراعم البيضاء وفي مرحلة إعادة النمو بعد الحصاد بمعدل ٢٥ مل / دونم
الفراولة في الحقل	٥٥ مل لكل ٥٠-٢٠ لتر ماء / دونم	يتم عمل تطبيق واحد عند ظهور البراعم الخضراء ويتم عمل التطبيقات التالية عند البراعم البيضاء وفي مرحلة إعادة النمو بعد الحصاد بمعدل ٢٥ مل / دونم
قصب السكر	١٠٠ مل لكل ٥٠-٢٠ لتر ماء / دونم	في مرحلة من ٦-٤ اوراق وفي حالة النقص الشديد يمكن تكرار التطبيق بنفس المعدل كل ١٠ الى ١٤ يوم.
المحاصيل المحمية	٥٥ مل لكل ١٠٠ لتر ماء / دونم	---

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمدة التي تطبق عن طريق الرش وليس جميعها وينصح بعمل تجربة خلط مصغر على نطاق ضيق قبل الرش.