

المجموعة
Pyridinecarboxamide

فلونيباب - ٥٠%

مبيد حشري زراعي سام
حبيبات ذائبة في الماء



مبيد حشري جهازى يعمل عن طريق الملامسة والتغذية والمعدة مما يؤدي إلى وقف التغذية وبالتالي موت الحشرات المستهدفة ويوفر تحكماً طويلاً للأمد.

التركيب: كل كغم يحتوي على:

٥٠% و/و (مادة فعالة)

فلونيكاميد

الخواص:

فلونيباب - ٥٠%، يعمل على القضاء على مجموعة كبيرة من الآفات الزراعية مثل المن والبق ويعمل على قمع الآفات الأخرى.

فلونيباب - ٥٠%، يعمل عن طريق الملامسة والتغذية حيث تتوقف الحشرات المستهدفة عن التغذية بشكل سريع وتموت ويمكن أن تبقى الحشرات على النباتات حتى تجف وتموت.

فلونيباب - ٥٠%، له أثر متبقي طويل الأمد مما يقلل أعراض الإصابة والأمراض.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الحد الأعلى المسموح به للتطبيق الواحد (غم / السنة)	الحد الأعلى المسموح / (غم) / السنة	عدد التطبيقات في السنة الواحدة	فترة ما بين التطبيقات (أيام)	فترة الامان (أيام)
البروكلي، الكرنب، الملفوف، الزهرة.	المن، بق النبات.	٣ - ٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
	الذبابة البيضاء	٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
الرشاد، اللفت، الخردل الأخضر، الفضل، الجرجير.	المن، بق النبات	٣ - ٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
	الذبابة البيضاء	٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
القطن	بق النبات، النطاطات.	٤ - ٢، ٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣٠
	المن	٢ - ٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
التطبيق الأرضي: الخيار، الشمام، القرع، الكوسا، البطيخ.	المن، بق النبات	٣ - ٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
	الذبابة البيضاء	٤ سم	٤	١٢	٣	٧	٣
الري بالتنقيط: الخيار، الشمام، القرع، الكوسا، البطيخ.	المن، بق النبات، الذبابة البيضاء، التريس.	٤ - ٦ سم	٦	١٢	٢	٧	٣

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتدابير راجع النشرة الخاصة بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الأفضة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الحد الأعلى المسموح به / (غم) للتطبيق الواحد	الحد الأعلى المسموح / (غم) السنة	عدد التطبيقات في السنة الواحدة	فترة ما بين التطبيقين (أيام)	فترة الامان (أيام)
الرش الورقي، الخيار في البيوت البلاستيكية	المن، بق النبات	٤ - ٦ غم أو ١,٨٥ - ٢,٨٥ غم / ٢م ١٠٠	٦	١٢	٢	٧	٣
	الذبابة البيضاء.	٢,٨٥ أو ٦ غم / ٢م ١٠٠					
تطبيق التربة، الخيار في البيوت البلاستيكية	المن، بق النبات، الذبابة البيضاء.	٤ أو ٦ غم / ٢م ١٠٠	٦	١٢	٢	٧	٣
التطبيق الأرضي: البادنجان، البنندورة، الفلفل، اليامية	المن، بق النبات، الذبابة البيضاء، السيلا.	٤ - ٦ غم	٤	١٢	٣	٧	٣
الري بالتنقيط، البادنجان، البنندورة، الفلفل، اليامية.	المن، بق النبات، الذبابة البيضاء، التريس	٤ - ٦ غم	٦	١٢	٢	٧	٣
الرش الورقي، البنندورة في البيوت البلاستيكية.	المن، بق النبات، السيلا.	٤ - ٦ غم أو ١,٨٥ - ٢,٨٥ غم / ٢م ١٠٠	٦	١٢	٢	٧	٣
	الذبابة البيضاء.	٢,٨٥ أو ٦ غم / ٢م ١٠٠					
الرش الورقي، الفلفل في البيوت البلاستيكية.	المن، بق النبات.	٤ - ٦ غم أو ١,٨٥ - ٢,٨٥ غم / ٢م ١٠٠	٦	١٢	٢	٧	٣
	الذبابة البيضاء، التريس.	٢,٨٥ أو ٦ غم / ٢م ١٠٠					
الجنجل	المن	٢,٤ - ٤ غم	٤	١٢	٣	٧	١٠
الكرفس، الشمر	المن، بق النبات.	٣ - ٤ غم	٤	١٢	٣	٧	٣
	الذبابة البيضاء	٤ غم					
الكرزيرة، الخس، البقدونس، السبانخ، السلق.	المن، بق النبات.	٣ - ٤ غم	٤	١٢	٣	٧	٣
	الذبابة البيضاء	٤ غم					
الرش الورقي، الخس في البيوت البلاستيكية	المن، بق النبات.	١,٨٥ أو ٤ غم / ٢م ١٠٠	٤	٤	١	---	٣
الخرشوف، الكسافا، الزنجبيل، البطاطا، البطاطا الحلوة، الكركم	المن، بق النبات، بسيلا البطاطا.	٣ - ٤ غم	٤	١٢	٣	٧	٧
	الذبابة البيضاء	٤ غم					

المحصول	الافسدة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الحد الأعلى المسموح به للتطبيق (غم) / الحد الأعلى المسموح / (غم) السنة	عدد التطبيقات في السنة الواحدة	فترة ما بين التطبيقين (أيام)	فترة الامان (أيام)
البنجر، الجزر، اللفت، الهندباء، الضجل.	المن، بق النبات، بسببلا البطاطا.	٣ - ٤ غم	١٢	٣	٧	٣
	الذباية البيضاء.	٤ غم				
التفاح، الاسكندنيا، الاجاص، السفرجل.	المن، بق النبات	٣ - ٤ غم	١٢	٣	٧	٢١
المشمش، الكرز، النكتارين، الخوخ، الدراق.	المن، بق النبات	٣ - ٤ غم	١٢	٣	٧	١٤
اللوز، الصنوبر، البلوط، الكاجو، الكستنا، جوز الهند، البندق، الفستق، الجوز.	المن	٣ - ٤ غم	١٢	٣	٧	٤٠
	بق النبات	٤ غم				
الجريب فروت، الليمون، البرتقال اليموني، الكمكوات، العنب، الكيوي	بسببلا الحمضيات.	٤ - ٨ غم	١٢	٣	٧	٣
	المن	٤ غم				
البليويري، التوت البري، الفراولة، بذور اللفت، السمسم، الكانولا	المن، بق النبات.	٤ - ٦ غم	١٢	٣	٧	٧
	البق الدقيقي	٤ غم				
دوار الشمس، الجوجوبا، شجرة زيت الشاي، الزعفران	المن، بق النبات، الفراولة.	٤ غم	١٢	٣	٧	٣
	المن، بق النبات	٤ غم	١٢	٣	٧	٧
الفاصولياء، الترمس، البازيلاء، اللوبيا، الفول، الحمص، العدس، فول الصويا.	المن، بق النبات	٤ غم	١٢	٣	٧	٧
البرسيم	المن، بق النبات	٤ غم	٨	٢	٧	١٤
زهرة البرسيم	المن، بق النبات	٤ غم	٨	٢	٧	٦٠
التنعج	المن	٣ - ٤ غم	١٢	٣	١٤	٧

تحذيرات:

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- ابدأ في التطبيقات قبل أن تصل أعداد الحشرات الى الحد الحرج وقبل ظهور الضرر.
- للتحكم الأمثل يجب التغطية الشاملة لرذاذ المبيد على أوراق النبات. يجب وضع كمية كافية من الماء لضمان التغطية الجيدة.
- قم بتطبيق المبيد عند ظهور الذبابة البيضاء وقبل أن تصل أعدادها الى الحد الحرج.
- لا تستخدم هذا المنتج بطريقة يمكن من خلالها الاتصال بالعاملين أو الأشخاص الآخرين، سواء بشكل مباشر أو من خلال الانجراف.
- لا تقم بتخزين خليط المبيد **فلونيثاب** - ٥٠٪ طوال الليل.
- لا تستخدم هذا المنتج في حدائق المنزل.
- لا تستخدم الأسمدة السائلة كناقل للمبيد **فلونيثاب** - ٥٠٪.
- لا تستخدمه من خلال أي نظام ري متصل بنظام مياه عام.
- قم بتدوير استخدام مبيدات الحشرات أو المجموعة ٢٩ الأخرى خلال الموسم أو بين الفصول مع مجموعات مختلفة تتحكم بنفس الآفات. تجنب استخدام المبيد لأكثر من الحد الأقصى لمعدل الاستخدام الموسمي أو العدد الإجمالي للرشاشات المتتالية من **فلونيثاب** - ٥٠٪ في الموسم.
- يجب أن يكون نظام الرش نظيفاً وخالياً من بقايا التطبيقات السابقة. املاً الخزان بمقدار ٢/١ بماء نظيف. يجب أن يكون نظام التقلب يعمل وكاف لتوفير خلط رذاذ موحد أثناء التطبيق. يجب ملء خزان الرش بالكامل إلى المستوى المطلوب.
- عند إجراء التطبيقات في الظروف الحارة والجافة، استخدم قطرات أكبر لتقليل آثار التبخر.

ارشادات الاستعمال:

- الجرجير:** لا يطبق المبيد عند غمر الجرجير بالماء، حيث يجب إيقاف المياه لمدة ٢٤ ساعة قبل أي تطبيق للمبيد ويمكن إرجاعها مرة أخرى خلال ٢٤ ساعة بعد التطبيق.
- البرسيم:** لا يسمح بالحصاد خلال ١٤ يوماً من آخر معاملة.
- زهرة البرسيم:** لا يسمح بالحصاد خلال ٦٠ يوماً من آخر معاملة.
- الضول، البازيلا، اللوبيا، الحمص، العدس، فول الصويا، دوار الشمس، الجوجوبا، زهرة الزعفران، نبات زيت الشاي، بذور اللفت، السمسم، الكانولا، التوت البري،**
- ستتوقف الحشرات المستهدفة عن التغذية بسرعة ولكن قد يستغرق ذلك عدة أيام لرؤية الانخفاض في أعداد الحشرات. أعد التطبيق عند اكتشاف حشرات جديدة.
- تطبيقان متتاليان يؤديان إلى تحكم أفضل من تطبيق واحد.
- الكانولا، البلوبيري، التوت البري، الفراولة، الحمضيات:** قد تعمل المواد المساعدة adjuvant على تحسين التغطية ولكن لا تستخدم مواد لاصقة Sticking agents. استخدم فقط المواد المساعدة المعروفة أنها آمنة حسب النشرة.
- أبدأ بالتطبيق عند ظهور الحشرات وقبل أن تصل للمستويات الحرجة.
- القطن:** يمكن استخدام الجرعة الأدنى مبكراً في الموسم أو عند الخلط مع المبيدات الأخرى.
- البنجر، اللفت، الفجل، البقدونس، الجزر:** ابدأ بالتطبيق الورقي عندما تصل أرقام من الخوخ الأخضر إلى ٥ لكل ١٠٠ ورقة، أو وجود ١ من مجنح/ نبات.

الخرشوف، الكاسافا، الزنجبيل، البطاطا، البطاطا حلوة، الكركم؛

- يوصى بالتطبيق كإجراء تكميلي للمراقبة الورقية لمن الخوخ الأخضر في البطاطا الموسمية طويلة الموسم بعد برنامج رش يستخدم مبيدات الحشرات النظامية وللمكافحة الأولية لمن الخوخ الأخضر في البطاطا قصيرة الموسم.
- ابدأ بالتطبيق الورقي عندما تصل أرقام من الخوخ الأخضر إلى ٥ لكل ١٠٠ ورقة، أو وجود ١ من مجنح/ نبات.

الري بالتنقيط؛

- الخيار، الشامام، القرع، الكوسا، البطيخ، الباذنجان، البندورة، الفلفل، البامية؛
- التطبيق الأكثر فعالية هو عندما يتم تطبيق المبيد بحيث تكون الجذور في موقع التطبيق أو بالقرب منه.
- بالنسبة للمحاصيل المزروعة، قم بتطبيق المبيد في غضون ٢١ يوماً من الزراعة.
- بالنسبة لمحاصيل البذر المباشر، يمكن البدء بالتطبيق في غضون ٤٥ يوماً من الزراعة.
- يجب أن يتم تطبيق المبيدات التي تحتوي على فلونيكاميد على شكل رش ورقي.

التطبيق على التربة؛

الخيار في البيوت البلاستيكية؛

- يمكن التطبيق باستخدام المرشة اليدوية أو الري بالتنقيط.
- استخدم ٩٥ لتراً كحد أدنى لكل ١٠٠٠ نبتة.
- يوصى بالتطبيق على عدد قليل من النباتات قبل التطبيق على البيت البلاستيكي بأكمله.

مقيدات الاستعمال؛

- لا يطبق مباشرة على المياه، أو على المناطق التي توجد فيها المياه السطحية.
- هذا المنتج قليل السمية على النحل والحشرات الأخرى المعرضة للمبيد بشكل مباشر، أو لخلفات المحاصيل أو الأعشاب الضارة. يجب حماية الحشرات الملقحة باتباع اتجاهات الرش المناسبة لتقليل الانجراف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش؛

- يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط؛

- قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة المعروفة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.