

المجموعة:  
Avermectin<sup>(1)</sup>  
Diamide<sup>(2)</sup>

# كلورا- ٣,٦٪

مبيد حشري وللحلم / مركز معلق



مبيد حشري وللحلم لمكافحة العث والحلم و الافات الحشرية على اشجار التفاحيات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

١,٨ ٪ و / ح (مادة فعالة)  
٤,٥ ٪ و / ح (مادة فعالة)  
ايامكتين<sup>(1)</sup>  
كلورانترايليبيرول<sup>(2)</sup>

الخواص :

كلورا - ٣,٦٪ : مبيد حشري وللحلم بمزيج من مادتين كلورانترايليبيرول و ايامكتين.  
كلورا - ٣,٦٪ : يستخدم لمكافحة العث والحلم على اشجار التفاحيات.

الاستعمالات :

المحصول	الافقة	معدل الاستخدام ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
اشجار التفاحيات: التفاح, الاجاص, السفرجل, الاسكندنيا	عثة ثمار التفاح, عثة التفاح البنية, دودة البراعم, دودة اللوز، عثة الثمار الشرقية، الحلم ذو النقطتين، الحلم الاحمر الاوروبي	١١ مل	٧	- لا يرش المبيد اكثر من مرة في الموسم. - يجب التطبيق قبل أن تصل الافة الى الحد الحرج. - يجب التطبيق بعد سقوط بتلات الازهار باسبوعين الى ٦ اسابيع، اذا لوحظت اعداد كبيرة من البيوض الشتوية للحلم او وصول الحلم الى مستوى الحد الحرج في بداية الموسم. - لا يرش المبيد على النبات في حال استخدام مبيدات من المجموعة (٦) خلال الموسم. - لا يرش المبيد على النبات في حال تطبيق ثلاث مبيدات من المجموعة (٢٨) خلال الموسم. - لا يرش المبيد كلورا-٣,٦٪ بتركيز اكبر من الضعف.

**تحذير :** يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

**فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :**

يجب عدم دخول الحقل المرشوش لمدة ٢٤ ساعة من آخر معاملة رش.

**فترة تحريم دخول الحقل المرشوش لحيوانات الماشية :**

يمنع الرعي في الحقل المرشوش قبل مرور ٢٨ يوم على آخر معاملة رش.

**قابلية الخلط :**

قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمدة الورقية، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.