



بايروكسيغاب - ٤٨٪

مبيد حلم وحشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

المجموعة:
N.A

مبيد يكافح افة الحلم بأنواعها و اطوارها المختلفة عن طريق الملامسة ومكافحة بعض الآفات الحشرية على مدى واسع من المحاصيل الوارد ذكرها في جدول الإستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٤٨٪ و / ح (مادة فعالة) فئبايروكسيغاب

الخواص :

بايروكسيغاب - ٤٨٪ : مبيد يكافح الحلم بانواعه ونشاطات الأوراق والبسبلا والذبابة البيضاء على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

بايروكسيغاب - ٤٨٪ : يعمل باللامسة حيث يعمل على إيقاف تغذية الحلم بشكل مباشر بعد تعرضه للتطبيق حيث يتم القضاء على الحلم خلال ٣-٧ أيام.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الفترة بين الرشات (أيام)	الحد الأعلى المسموح للتطبيق (مل / دونم /سنة)	عدد التطبيقات الامان (أيام)	فترة الامان
اللوز والستق الحلبى	الحلم	٣٦-٨٧ مل	١٤	٩٤٦	٢	خلال السنة ١٤
الموز	الحلم ، الذبابة البيضاء	٢٤-٤٨ مل	٧	٤٧٣	٢	خلال السنة ٧
الضول والفاصولياء والحمص وفول الصويا	الحلم ، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣
التوت والفرولة	الحلم ، الذبابة البيضاء	٢٤-٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣
توت العليق	الحلم ، بق النبات نشاطات الاوراق	٤٨ مل ٢٤-٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣
الحمضيات	حلم صدا الحمضيات صانعات الانفاق، تريس الحمضيات، نشاطات الأوراق، بق النبات، الحلم	٩٥ مل ٤٨-٩٥ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ويستمر أثر المكافحة لمدة ١٤ يوم ٣
البندورة والباذنجان والفلفل والباميا	الحلم، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣
البندورة (الببوت المحمية)	حلم، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	١٤	٤٧٣ للدونم للدورة الزراعية	٤	خلال السنة خلال الدورة الزراعية ٣
الكرفس	الحلم ، الذبابة البيضاء	٢٤ - ٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣
البطيخ والشمام والكتنالوب	الحلم ، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢	خلال السنة ٣

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الاقطعة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الفترة بين الرشات (أيام)	الحد الأعلى المسموح للتطبيق (مل / دونم / سنة)	عدد التطبيقات	فترة الامان (أيام)
النعنع	الحلم	٢٤-٤٨ مل	٧	٤٧٣	٢ خلال السنة	٣
التفاحيات	نظاطات الأوراق، اليق، الحلم بسيلا الاجاص	٢٤-٤٨ مل	١٤	٢٣٧	٢ خلال السنة	١٤
		٤٨ مل	---		تطبيق واحد خلال السنة	
البطاطا	الحلم، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	٧	٤٧٣	٢ خلال السنة	٧
الذرة	الحلم	٢٤-٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢ خلال السنة	١٤
الخيار والكوسا والقرع	الحلم، الذبابة البيضاء	٢٤-٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢ خلال السنة	٣
الخيار (البيوت المحمية)	الحلم، الذبابة البيضاء	٢٤-٤٨ مل	---	٢٣٧ للدونم للدورة الزراعية	٢ خلال السنة تطبيق واحد خلال الدورة الزراعية	٧
اللوزيات	الحلم، نظاطات الاوراق	٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢ خلال السنة	٧
نباتات الزينة	الحلم، يق النبات، نظاطات الأوراق	٢٤-٤٨ مل	١٤	٢٣٧	لا يطبق في مشاتل الحمضيات والبيوت المحمية المزروعة بالحمضيات	---
العنب والكيوي	الحلم ، يق النبات نظاطات الاوراق	٤٨ مل ٢٤-٤٨ مل	١٤	٢٣٧	٢ خلال السنة في حالة وجود كثافة في العناقيد يستعمل مرشات ضخ عالي وي في حال استخدام مرض منخفض الضغط يجب التأكد من التغطية الكاملة للنبات	١٤
الافوكادو والمانجو والبابايا والرمان	الحلم، الذبابة البيضاء	٤٨ مل	١٤	٤٧٣	٢ خلال السنة	٧
الأرضي شوكي والزنجبيل والبطاطا الجلوة والكرم	الحلم، نظاطات الأوراق	٤٨ مل	٧	٤٧٣	٢ خلال السنة	٧

تحذير :

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الامان قبل عملية القطف.
- لا يستخدم المبيد خلال أي نظام من أنظمة الري.

فترة الأمان لاعادة زراعة المحاصيل :
لا يجب زراعة أي محصول في التربة المعاملة غير المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات الا بعد مرور ٣٠ يوم على الأقل من اخر معاملة.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :
يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على اخر معاملة.

قابلية الخلط :
قابل للخلط مع معظم المبيدات الاخرى و ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.