



المجموعة:
Phenylpyrazoline

بينوكسافاب-١٠٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد عشبي اختياري يكافح الاعشاب التي تصيب حقول القمح والشعير قبل الاتبات.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

١٠٪ و/ح (مادة فعالة)

بينوكسادين

الخواص:

بينوكسافاب-١٠٪: مبيد عشبي يستعمل في حقول القمح الشتوي والقمح الربيعي (ما عدا القمح القاسي) والشعير من مرحلة الورقتين الى ما قبل مرحلة الازهار والأخشاب.

بينوكسافاب-١٠٪: مبيد عشبي اختياري يكافح الاعشاب خلال ٣-٥ اسابيع.

بينوكسافاب-١٠٪: ينتقل من المجموع الخضرى بشكل سريع عن طريق الاوراق والسيقان.

بينوكسافاب-١٠٪: التطبيق المبكر للمبيد يؤدي الى تحسين انتاجية المحصول حيث يقلل تنافس الاعشاب مع المحصول.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	موعد التطبيق	ملاحظات الاستعمال	معدل الاستعمال	الاعشاب	المحصول
٦٠	عدد أوراق الفرع الرئيسي: ٦-١ أوراق الاشطاء: قبل الاتبات الرابع	لا يجب ان يتم التطبيق اكثر من مرة للمحصول الواحد في السنة	٦٠ مل / دونم	عشبة الزوان، عشبة الشووان، عشبة الشووان البري	القمح الربيعي (ما عدا القمح القاسي)
	عدد أوراق الفرع الرئيسي: ٥-١ أوراق الاشطاء: لنتائج افضل يوصى بالتطبيق قبل الاتبات الثالث خلال فترة نمو الاعشاب			عشبة الذنبية، عشبة الكتاري، عشبة ذيل الثعلب بانواعها، الدخن، عشبة الريح	القمح الشتوي الشعير

تحذير:

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطف.

- يجب استعمال مادة مساعدة (OIL BASED ADJUVANT) مع المبيد.

تبهیبات:

- معاملة البذور بمبيد قد تقلل قدرتها على الانبات لذلك ينصح بمعاملة كمية قليلة من البذور بمبيد واجراء اختبار للانبات قبل التطبيق على البذور بشكل أكبر.
- ينصح بمعاملة الحقل بمبيد عشبي من مجموعة أخرى لتقليل قدرة الاعشاب على المقاومة.
- يمكن خلطه مع مبيدات الاعشاب عريضة الاوراق التي تحتوي على الماد الفعالة التالية: Thifensulfuron-Methyl/Tribenuron-Methyl, Metsulfuron Methyl, Triasulfuron, Octanoic Acid Ester Of Bromoxynil, Heptonic Acid Ester Of Bromoxynil, Mcpa Ester, Clopyralid, Florasulam, Chlorsulfuron, Clopyralid, Prosulfuron, Fluroxypyr. ويتم تطبيق اي مبيد عشبي اخر بعد ٤ أيام من تطبيق بينوكسافاب - ١٪
- ينصح بعمل كشف بشكل مستمر على الاعشاب في الحقل المعامل حيث ان الاعشاب تتوقف عن النمو بعد ٤٨ ساعة من التطبيق.
- عند ايقاف عملية التطبيق بشكل مؤقت يجب تحريك محلول قبل اكمال التطبيق.
- لا يطبق المبيد مع اي منتج يحتوي على مادة كلودينافوب بروبارجيل على نفس المحصول في نفس الموسم.
- لا يطبق المبيد على المحاصيل التي تعاني من الاجهاض حيث قد يسبب ضرر للمحصول ويقلل أو يأخر مكافحة الاعشاب.

تناوب المحاصيل للزراعة المتلاحقة:

القمح والشعير: ٠ يوم، المحاصيل الورقية والجذرية: ٣٠ يوم، محاصيل الحبوب والمحاصيل الاخرى: ٩٠ يوم

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة من اخر معاملة رش

فترة تحرير دخول حيوانات الرعي:

يمنع دخول الحيوانات الرعوية الى الحقل المرشوش او حصاد المحصول لغايات انتاج العلف قبل مرور ٣٠ يوم من اخر معاملة رش، و يمنع تغذية حيوانات الرعي بقش المحصول المعامل قبل مرور ٦٠ يوم من اخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

- لا يجب خلطه مع اي مواد تحتوي على عوامل مؤكسدة
- قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية والأسمندة المعروفة، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة خلط على نطاق ضيق قبل الرش. وقد يسبب ضرر للنبات عند خلطه مع مركبات تحتوي على مادة أزوكتسي ستروبين ودايفينوكونازول تحت ظروف جوية غير مناسبة.