

المجموعة:
Phenylpyrrole

دروجون - ٤٨٪

مبيد فطري

مركز انسيابي لتتقيم البذور



معقم بذور وقائي غير جهازي، يمنع انبات الكونيديا و نمو الميسيليوم لتجنب احتمالية حدوث الامراض الفطرية.

التركيب : كل لتر يحتوي على:

٤٨٪ و ح (مادة فعالة)

فلوديوكسونيل

الخواص :

دروجون - ٤٨٪ : معقم بذور وقائي ، يحمي من الأمراض الفطرية في التربة والبذور التي تصيب المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

دروجون - ٤٨٪ : مبيد فعال ضد أمراض البذور الفطرية مثل لشفة الساق والقرن ، ويحمي من العفن الثلجي الزهري وأمراض فطرية اخرى على البذور.

الاستعمالات :

معدل الاستعمال مل / ٤٥,٤ كغم بذور	الاففة	المحصول
٣-٥ ١-٣	للوفاية من الأمراض الفطرية على البذور وفي التربة مثل : عفن البذور، لفحات الاشتال وفعال على أمراض سقوط البادرات مثل <i>pythium</i> و <i>phytophthora</i> .	الشعير، الشوفان، القمح، الذرة الرفيعة. أرز.
٣-٥	العفن الثلجي الزهري.	الذرة الرفيعة.
٣-٥ استخدم ١-٢,٢ مل لكل ٨٠٠٠٠ بذرة ذرة	للوفاية من الأمراض الفطرية على البذور وفي التربة مثل : عفن البذور، لفحات الاشتال وفعال على أمراض سقوط البادرات مثل <i>pythium</i> و <i>phytophthora</i> . تضمم الرؤوس (<i>Sphacelotheca reiliana</i>)	حقول الذرة

معدل الاستعمال مل/ ٤,٥ كغم بذور	الأففة	المحصول
٣		الذرة الحلوة.
٦-٣		القطن.
٥-٣		البطيخ، الخيار، القرع، الشام، الكوسا، اليقطين.
٥-٣		الباذنجان، البندورة، الباميا، الفلفل.
٥-٣		الأعشاب التي تستخدم كأعلاف .
٥-٣		الخضروات التي تزرع لحصاد الأجزاء الخضرية الساق والرأس : البروكلي، الملفوف، الزهرة، الخردل.
٥-٣	للقاية من الأمراض الفطرية على البذور وفي التربة مثل : تعفن البذور، نضحات الاشتال وفعال على أمراض سقوط البادرات مثل <i>pythium</i> و <i>phytophthora</i> .	البابونج، الهيل، النعناع البري، القرنفل، الكزبرة، الكمون، الشمر، الحلبة، المردقوش، الخردل، جوزة الطيب، الزعفران.
٥-٣		الخضراوات التي تزرع لحصاد أوراقها : الكرفس، الخس، البقدونس، السبانخ، الهندباء، السلق.
٥-٣		أوراق الخضروات الجذرية والدرنية : (غذاء الإنسان أو علف الحيوان) الشمندر، الجزر، الكسافا، الجزر الأبيض، الفجل، البطاطا الحلوة، اللفت.
٥-٣		الذول، الترمس، البازلاء، اللوبيا، الحمص، العدس.
٥-٣		الأعلاف الحيوانية غير العشبية : البرسيم، الترمس، الفول.
٥-٣		الثوم، الكراث، البصل.
٥-٣		الذول السوداني.
٣		البطاطا.
٥-٣		بذور الكتان، السمسم.
٥-٣		الخضراوات الجذرية : الخرشوف، البنجر، الفجل، الجزر الأبيض، الجزر، الزنجبيل، البقدونس، الكركم.
٥-٣		فول الصويا.
٥-٣		عباد الشمس.

العجينة الرطبة:

- استخدم معدات خاصة للمعاملة الرطبة لتحقيق التغطية الكاملة.
- اخلط جيدا الكمية المحددة من دروجون -٤٨% مع الكمية المناسبة من الماء او مع سائل مخصب (liquid inoculant) في ماكينة الخلط (slurry treater) .
- التحريك المستمر ضروري.
- اترك البذور المعاملة لتجف قبل تعبئتها، قبل اضافة البذور إلى صواني التشتيل يجب التأكد من جفافها تماما.

تحذير : يجب عدم استعمال المبيد على بذور المحاصيل الزراعية غير المذكورة في جدول الاستعمالات .

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة: يمنع دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحريم دخول الحقل المعامل لحيوانات الماشية:

لا تسمح للحيوانات بالرعي على المحاصيل المزروعة بالبذور المعالجة بالمبيد دروجون-٤٨% حتى ٣٠ يوماً بعد الزراعة مثل الاعشاب التي تزرع لتستخدم كعلف. المحاصيل التي تستخدم كعلف مثل البرسيم، الذرة، محاصيل الحبوب، الترمس، الرز، القمح الخ..

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل المعاملة ويتم ترك المحلول لمدة ساعة ملاحظة اي تغيرات.