

المجموعة:
Diamide

ستورا - ٤٨%

مبيد حشري / مركز معلق



مبيد حشري لمكافحة آفات حشرية الأجنحة المختلفة على المحاصيل الزراعية الواردة في الجدول

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٤٨% و/ح (مادة فعالة) فلوبيتدياميد

الخواص:

ستورا - ٤٨%: مبيد حشري جهازى يعمل بشكل أساسي عن طريق المعدة.
ستورا - ٤٨%: يمكن استخدامه في برامج مكافحة المتكاملة للآفات حيث أن تأثيره خفيف على الحشرات المفيدة (عند استخدامه حسب التعليمات المذكورة).

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
بروكلي، ملفوف، زهرة	عثة الظهر الماسي، فراشة الملفوف، دودة أوراق التبغ، العث	١٠٠-٧٥ مل/هكتار	٣
الخيار، بطيخ، القرع، الكوسا	العث	١٠٠ مل/هكتار	١
الطليفة، الباذنجان، البندورة، الفلفل	العث، صانعات الانفاق	١٠٠ أو ١٥٠ مل/هكتار	١
الخبس، السلق، جرجير الكرفس	العث	١٠٠-٧٥ مل/هكتار	١
البطاطا، البطاطا الحلوة، الجزر، الفجل، الشمندر، القلقاس، البقدونس	عثة الظهر الماسي، فراشة الملفوف، دودة أوراق التبغ، صانعات الانفاق	١٠٠-٧٥ مل/هكتار ١٠٠ أو ١٥٠ مل/هكتار	١
الفراولة	دودة أوراق التبغ، العث	١٠٠ مل/هكتار	١

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الجدول مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- تطبيق هذا المبيد على محاصيل غير الواردة بالجدول اعلاه قد يسبب سمية لهذه المحاصيل.
- لا يرش أكثر من ثلاث رشات للمحصول الواحد
- يتم إعادة الرش بعد ٧-٤ يوم من آخر معاملة رش، اعد التطبيق بفترة زمنية اقل ٧-١٠ ايام في حالات الإصابة الشديدة
- لا يتم تطبيقه عن طريق معدات الرش المحمولة على ظهر المستخدم.
- ابدأ الرش عند فقس البيض او بعد وقت قصير من ذلك لاستهداف اليرقات الصغيرة، عدا عن ذلك يتم بدء الرش عادة عند الوصول للعتبة الاقتصادية للمحصول.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :
يجب عدم دخول الحقل المرشوش إلا بعد جفاف المنطقة المعاملة بالمبيد.

قابلية الخلط :
قابل للخلط مع معظم المبيدات، ويفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.