

المجموعة:
Cyclohexanedione
Oxime

فابوديم - ٢٤٪

مبيد عشبي

مركز قابل للاستحلاب



مبيد أعشاب جهازي اختياري يستخدم على الأعشاب الرفيعة بعد الانبات.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٢٤٪ و/ح (مادة فعالة)

كليثوديم

الخواص:

فابوديم - ٢٤٪: مبيد أعشاب جهازي أختياري يستخدم على الأعشاب بعد الانبات، لمكافحة الأعشاب الرفيعة السنوية والمعمرة.

فابوديم - ٢٤٪: تظهر الأعشاب المعالجة انخفاضاً في النمو والنشاط، وانهاراً تدريجياً للأوراق، وستتم ملاحظة الأعراض بشكل عام خلال ٧ إلى ١٤ يوماً بعد الاستخدام.

الاستعمالات:

المحصول	نسبة الاستعمال ٢٠/ لتر ماء	ملاحظات	فترة الامان (يوم)
البرسيم	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ٢٤ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	١٥ قبل الرعي او الحصاد للاستخدام كعلف
الهليون	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣
البقوليات الجافة : الفاصولياء، الحمص، اللوبيا	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ٢٤ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
البنجر (الشمندر)	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
الكانولا	٦ - ٩ مل	لا تستعمل اكثر من ٩ مل لكل ٢٠ لتر ماء في الموسم الواحد.	٧٠
الخبس والبقدونس	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	١٤
القطن	٩ - ٢٤ مل	لا يتم الرعي على المحصول المعامل.	٦٠
التوت البري	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة. لا يطبق المبيد في مرحلة تكوين الفاكهة.	٣٠
القرع، الكوسا، البطيخ، الشمام	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	١٤
الارض الغير مستخدمه للزراعة	٩ - ٢٤ مل	لا تزرع الا بعد ٣٠ يوم من آخر معاملة الا اذا كان المبيد يستخدم على المحصول المراد زرع.	---
الكتان	٩ - ١٢ مل	لا تستعمل اكثر من ٢٤ مل / ٢٠ ماء في الموسم الواحد. يتم الرش قبل الأزهار.	٦٠

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	نسبة الاستعمال ٢٠/ لتر ماء	ملاحظات	فترة الامان (يوم)
الكرفس	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
الجزء الخضري (الرأس والساق) بروكلي، المفوف، الزهرة	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
الأعشاب: البلسم، الريحان، البابونج، الكزبرة، الكاري، عشبة الشبت، اللافندر، البردقوش، إكليل الجبل، الميرامية.	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	١٤
البقوليات الخضراء صالحة للاكل: الفاصولياء والبازلاء	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة. يستخدم مرة واحد في الموسم. للباذلاء استخدم قبل الازهار.	٢١
العدس	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ٢٤ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
البصل والثوم (الايصال الجافة)	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٤٥
البصل الاخضر و الكراث	١٢-٩ مل	---	١٤
نباتات الزيتية	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ٢٤ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد.	---
الفضول السوداني	٩ - ٢٤ مل	---	٤٠
البطاطا	٩ - ٢٤ مل	---	٣٠
الزنجبيل، الخرشوف، البطاطا الحلوة	٩ - ٢٤ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٣٠
البندورة	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة.	٢٠
السمسم	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة. لا يستخدم في مرحلة الازهار.	١٤
فول الصويا	٩ - ٢٤ مل	لا يتم رعي الحيوانات في الحقول المعاملة	٦٠
الفاولة	١٢-٩ مل	لا تستعمل اكثر من ١٢ مل لكل ٢٠ لتر ماء بالتطبيق الواحد. كرر الرش بعد ١٤ يوم من آخر معاملة لا يستخدم في مرحلة الازهار.	٤
البنجر السكري	٩ - ٢٤ مل	---	٤٠

الأعشاب المعمرة التي سيتم مكافحتها :

وقت التطبيق حسب طول العشب (سم)	الاسم العلمي	العشبة
٧,٥	<i>Cynodon dactylon</i>	الثيل / النجيل
٢٠-١٠	<i>Festuca arundinacea</i>	فستوكة قصبية
١٥-٥	<i>Hordeum jubatum</i>	شعير لبدي
٢٠-١٠	<i>Dactylis glomerata</i>	الإصبعية المنقودية أو حشيشة البستان
٣٠,٥-١٠	<i>Elytrigia repen</i>	رزين / شعير زاخف
٢٠-١٠	<i>Rhizome Johnsongrass</i>	عشبة جونسون
٢٠-١٠	<i>Perennial Bluegrass</i>	قبا معمر
٢٠-١٠	<i>Agrostis spp</i>	المرجة / الغضراء

الأعشاب الحولية التي سيتم مكافحتها :

وقت التطبيق / طول العشبة (سم)	الاسم العلمي	العشبة
٢٠-٥	<i>Echinochloa Crus-Gall</i>	الدخن الازغب / الدنبية
١٥-٥	<i>Bromus Species</i>	اعشاب البروم
١٠-٢,٥	<i>Phalaris Canariensis</i>	خرطار كناري
١٥-٥	<i>Digitaria Species</i>	عنى الثيل
١٥-٥	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	عشبة قدم الغراب / نبات النجم
٢٠-٥	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	الثمام
١٥-٥	<i>Cenchrus incertus</i>	السبب
٢٠-٥	<i>Setaria Species</i>	ذيل الثعلب
٣٠,٥-٥	<i>Setaria faberi</i>	
١٠-٢٥	<i>Eleusine indica</i>	البشنة
١٥-٥	<i>Echinochloa colona</i>	عشب ارز الغاية
١٥-٥	<i>Eragrostis cilianensis</i>	الأثب / عشبة الحب
١٠-٢,٥	<i>Polypogon monspeliensis</i>	عشبة قدم الارنب / الملتحية
٧,٥-٢,٥	<i>Oryza sativa</i>	الرز البري
١٥-٥	<i>Lolium Species</i>	الزوان / حشيشة الفرس
٢٥-١٠	<i>Sorghum halepense</i>	حشيشة الفرس / دخن حلبي
٤٥,٧-١٥	<i>Sorghum bicolor</i>	
١٥-٥	<i>Panicum</i>	ام زكية / الثمام
١٥-٥	<i>Hordeum vulgare</i>	الشعير البري
١٥-٥	<i>Avena sativa</i>	الشوفان البري
١٥-٥	<i>Panicum miliaceum</i>	الشيلم البري
١٥-٥	<i>Triticum aestivu</i>	القمح البري
٣٠,٥-٢٠	<i>Panicum miliaceum</i>	الدخن السوداني البري
عند ٤ اوراق	<i>Poa annua</i>	القبا الحولي

المحاذير:

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا يستخدم في أنظمة الري.
- اعلى حد لتكرار الرش ٤ تطبيقات.
- لا ينصح باستخدامه على محاصيل الخضروات المزروعة لإنتاج البذور.
- لا تستخدم المبيد على الاعشاب تحت الاجهاد بسبب قلة المياه او انقلاب درجات الحرارة الخ.
- يتم تكرار الرش على الاعشاب السنوية التي تنبت بعد تطبيق المبيد فابودييم - ٢٤%.
- لا تزرع أي محصول لمدة ٣٠ يوما بعد التطبيق الا اذا كان من المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.
- لا يستخدم عند توقع هطول أمطار خلال ساعة بعد الرش.
- لا تستخدم مبيد اعشاب أوراق عريضة بعد يوم واحد من استخدام المبيد فابودييم - ٢٤%.
- لا يستخدم على الأعشاب التي تم حرثها أو بعد بدء تكوين البذور أو التي تجاوزت مرحلة النمو الموصى بها.
- في المناطق القاحلة ذات الامطار المحدودة، طبق المبيد بعد الري خلال ٧ ايام ولنتيجة افضل طبق الرشة الثانية على الاعشاب المعمرة التي تنمو بعد ٢ إلى ٣ أسابيع من ظهور نمو جديد.

فترة تعريم دخول المنطقة المعاملة:

يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.