

المجموعة:  
Quinazoline

# فايستار- ٤، ٢٠٪

مبيد حلم زراعي سام / مركز معلق



مبيد حلم على شكل مركز معلق يعمل عن طريق الملامسة باثر سريع للأفات المذكورة في جدول الاستعمالات كما يكافح طور البيض عن طريق الملامسة ويكافح الاطوار البالغة وغير البالغة عن طريق الملامسة وعن طريق المعدة ويستخدم على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية مثل الأشجار، الخضروات، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤، ٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)

فيتازاكوين

الخواص :

فايستار - ٤، ٢٠٪ : مبيد فعال ذو تأثير صاعق خلال ٢٤ ساعة.  
فايستار - ٤، ٢٠٪ : يتحكم في الحلم وبعض الفطريات والحشرات المذكورة في جدول الاستعمالات.  
فايستار - ٤، ٢٠٪ : فعال بشكل كبير في مرحلة اليرقات وله تأثير على البيوض في العديد من الحشرات.  
فايستار - ٤، ٢٠٪ : يكافح طور البيض عن طريق الملامسة ويكافح الاطوار البالغة وغير البالغة عن طريق الملامسة وعن طريق المعدة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	ملاحظات الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
الافوكادو التوت	الحلم ( <i>Tetranychidae</i> , <i>Eriophyidae</i> <i>tarsonemidae</i> ) الأمراض الفطرية (تبقع الأوراق، البياض الدقيقي، الصدأ، الجرب).	٣٦ - ٥٣ مل	لا ترش أكثر من مره في السنة.	٧
		٣٦ - ٥٣ مل	لا تتجاوز نسبة الاستخدام ١٠٦٥ مل من المنتج لكل ٤ دونم في السنة.	٧
الجريب فروت، الكمكوات، الليمون، المندرين، البرتقال، البوملي، الخيار، الشمام، القرع، اليقطين، الكوسا، البطيخ، الباذنجان، البندورة، الطلفل، الباميا	الآفات الحشرية (نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء، بسيلا الأجاص).	٣٦ - ٥٣ مل		٣
		٣٦ - ٥٣ مل		٣
الفاصولياء، فول الصويا (البذور غير الناضجة)، وأصناف الفاصولياء الجففة (بما في ذلك الترمس، والفاصولياء، واللوبياء، والفاصولياء العريضة (الجافة)، والحمص، والعدس، والبازيلاء		٤٧ - ٥٣ مل		٧
		٣٦ - ٥٣ مل		٧
النعنع		٣٦ - ٥٣ مل		٧
التفاح، الاسكندنيا، السفرجل، الأجاص		٤٧ - ٥٣ مل		٧
العتب، الكيوي		٤٧ - ٥٣ مل		٧

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فترة الأمان (أيام)	ملاحظات الاستعمال	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الآفة	المحصول
٧	لا ترش أكثر من مره في السنة. لا تتجاوز نسبة الاستخدام ١٠٦٥ مل من المنتج لكل ٤ دونم في السنة.	٥٣ - ٤٧ مل	الحلم <i>(Tertranychidae, Eriophyidae tarsonemidae)</i>	اللوز، الكاجو، الجوز، الكستناء، جوز الهند، البنقدق، البقان.
٣	لا يرش أكثر من مره فترة قبل الحصاد في السنة الواحدة. لا يرش أكثر من مره فترة بعد الحصاد في السنة الواحدة. لا تتجاوز نسبة الرش ١٠٦٥ مل من المنتج لكل ٤ دونم في السنة قبل الحصاد. لا تتجاوز نسبة الرش ١٠٦٥ مل من المنتج لكل ٤ دونم في السنة بعد الحصاد.	٥٣ - ٤٧ مل	الأمراض الفطرية (تبقع الأوراق، البياض الدقيقي، الصدأ، الجرب).  الآفات الحشرية (نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء، بسيلا الأجاص).	النكتارين، الخوخ، البرقوق، المشمش

### تحذير :

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا يستخدم في أي نوع من أنظمة الري
- لا يرش إلا بعد أن تكون جميع المحاصيل خلال فترة سقوط البتلات.
- يجب ضمان التغطية الشاملة عند الرش.
- يمكن زراعة المحاصيل المذكورة في الجدول بعد ٣٠ يوماً من هذا تطبيق المبيد. لا تزرع الخضروات الجذرية والدرنات والبصيلات خلال ١٢٠ يوماً من هذا تطبيق المبيد فابيستار -٤، ٢٠%.
- هذا المبيد شديد السمية للنحل والحشرات الملقحة الأخرى المعرضة للمعالجة المباشرة أو للمخلفات الموجودة على المحاصيل المزهرة أو الأعشاب الضارة. لا تستخدم هذا المنتج أو تسمح له بالانجراف إلى المحاصيل المزهرة أو نباتات الزينة أو الأعشاب إذا كان النحل أو الحشرات الملقحة الأخرى متواجدة في منطقة التطبيق.
- قم بتدوير استخدام المبيد أو اي مبيد من مجموعة ٢١ و ٣٩ خلال موسم النمو، أو بين مواسم النمو، مع مجموعات مختلفة لمكافحة نفس الآفات.

### فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على اخر معاملة رش.

### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات و ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.