

المجموعة:
Synthetic auxin

فلوراتون سوبر



منظم نمو نباتي
مسحوق قابل للبلل

منظم نمو يحفز عقد الإزهار وتثبيتها

التركيب : كل كغم يحتوي على:

الفانثثيل أستيك أسيد

١٪ و/و (مادة فعالة)

الخواص :

فلوراتون سوبر : منظم نمو يحتوي على الفانثثيل أستيك أسيد، وهو أكسين اصطناعي يعمل على تحفيز عقد الأزهار وتثبيتها.

فلوراتون سوبر : يسمح بتقليل الحاجة إلى إزالة الأعشاب الضارة يدويًا، مما يقلل من تكاليف هذه العملية.

الاستعمالات :

المحصول	سبب التطبيق	معدل الاستعمال	عدد مرات التطبيق	فترة الانتظار بين الرشات	حجم محلول الرش	ملاحظات	فترة الامان (أيام)
الأجاص	خف الثمار Fruit thinning	١ - ١,٥ كغم /هكتار	١	---	١٠٠٠ لتر /هكتار	يتم تطبيقه خلال مرحلة نمو الثمار، من مرحلة الثمار التي يصل حجمها إلى ١٠ مم (عند وجود تساقط طبيعي للثمار) وحتى المرحلة التي تسبق وصول الثمار إلى حجم ٢٠ مم (قبل تساقط الثمرة الطبيعية الثانية).	---
	منع سقوط الفاكهة Fruit drop inhibition		٢	١٠ أيام		تطبيق من المرحلة التي وصلت فيها الثمار إلى ٩٠٪ من حجمها النهائي وحتى المرحلة التي تصل فيها الثمار إلى بداية مرحلة النضج المناسبة للقطاف.	٧
التفاح	خف الثمار Fruit thinning	١ - ١,٥ كغم /هكتار	١	---	١٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/هكتار	يتم تطبيقه خلال مرحلة نمو الثمار، من مرحلة الثمار التي يصل حجمها إلى ١٠ مم (عند وجود تساقط طبيعي للثمار) وحتى المرحلة التي تسبق وصول الثمار إلى حجم ٢٠ مم (قبل تساقط الثمرة الطبيعية الثانية).	---
	منع سقوط الفاكهة Fruit drop inhibition	١ كغم /هكتار	٢	١٠ أيام	١٠٠٠ لتر /هكتار	تطبيق من المرحلة التي وصلت فيها الثمار إلى ٩٠٪ من حجمها النهائي وحتى المرحلة التي تصل فيها الثمار إلى بداية مرحلة النضج المناسبة للقطاف.	٧

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

ملاحظات :

- يجب تبلييل كافة أجزاء النبات جيداً بمحلول الرش.
- يستعمل على النباتات القوية التي لا تعاني من العطش أو نقص السماد.
- لا يرش عندما تكون درجة الحرارة عالية جداً.
- تعتمد نتائجه كباقي منظمات النمو على عدة عوامل مثل درجات الحرارة والرطوبة وشدة الضوء وصنف النبات ونوعية وظروف التغذية.
- لتجنب وجود أي مشاكل تتعلق بحساسية الأصناف التي سيتم تطبيق المنتج عليها، ينصح بإجراء اختبارات مسبقة على الأصناف والظروف التي سيتم استخدام المنتج فيها.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش إلى حين جفاف محلول الرش.

قابلية الخاط :

يمكن خلطه مع معظم المبيدات والأسمدة الورقية، يجب عدم خلطه مع مخلوط بوردو أو مع منظمات النمو الأخرى ويجب عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش على مساحة واسعة.