

المجموعة:
Trace Element

منغنيز - بروفاب



سماد نباتي
سائل قابل للذوبان

التركيب : كل لتر يحتوي على:

٣% و / ح (مادة فعالة)

منغنيز

الخواص :

منغنيز - بروفاب : يتكون من مادة المنغنيز يستعمل لتصحيح نقص عنصر المنغنيز في المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

منغنيز - بروفاب : هو مصدر فعال لعنصر المنغنيز يطبق عن طريق الرش الورقي.

الاستعمالات :

المحصول	معدل الاستعمال / دونم	موعد التطبيق	الفترة بين الرشات
البطاطا، البطاطا الحلوة، الجزر	١١٨،٢٩ مل - ٩٤٦،٣٥ مل	عند بدء تكون الدرناات	١٤-٢١ يوم
البصل	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	بعد التخفيف، أو مرحلة ٣ إلى ٤ أوراق	١٤-٢١ يوم
الكرهس، الخس	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	بعد التخفيف، أو مرحلة ٣ إلى ٤ أوراق	١٤-٢١ يوم
البروكلي، المقوف، الزهرة	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	بعد التخفيف، أو مرحلة ٣ إلى ٤ أوراق	١٤-٢١ يوم
الفاصولياء، الفول، البازيلاء، فول الصويا	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	عند ظهور الورقة الثلاثية في العقدة الخامسة الى ظهورها عند العقدة السادسة والتفرع	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الشبوخة
الفاصل، البندورة، الباذنجان	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	عند زراعة المحصول	١٤-٢١ يوم
البطيخ، الخيار، الكوسا	١١٨،٢٩ مل - ٩٤٦،٣٥ مل	مرحلة ٣ إلى ٤ أوراق	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
البرتقال، الليمون	٢٣٦،٥٢ مل - ٧٠٩،٧٤ مل	عند الازهار الاول	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
التفاح، الاجاص	١١٨،٢٩ مل - ٩٤٦،٣٥ مل	عند الازهار الاول	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
الكرز، الخوخ، الدراق	١١٨،٢٩ مل - ٩٤٦،٣٥ مل	عند الازهار الاول	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
الفراولة، توت العليق	١١٨،٢٩ مل - ٩٤٦،٣٥ مل	عند الازهار الاول	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
الغنب	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	عندما يكون طول النموات الجديدة بين ١٠،١٦ - ١٥،٢٤ سم	----
اللوز، الفستق الحلبي، البندق، الجوز	٢٣٦،٥٢ مل - ٧٠٩،٧٤ مل	عند الازهار الاول	١٤-٢١ يوم حتى مرحلة الحصاد
الجبوب	١١٨،٢٩ مل - ٤٧٣،١٦ مل	عند ظهور أعراض النمو الربيعي أو النقص	١٤-٢١ يوم

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحديثات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

الفترة بين الرشاش	موعد التطبيق	معدل الاستعمال / دونم	المحصول
٢١-١٤ يوم	عند ظهور أعراض النمو الربيعي أو النقص	١١٨,٢٩ مل - ٤٧٣,١٦ مل	القش والمحاصيل المستعملة لانتاج البذور
---	في مرحلة ورقتين الى مرحلة الارباع الاوراق	١١٨,٢٩ مل - ٩٤٦,٣٥ مل	البرسيم والمحاصيل المستعملة للاعلاف
٢١-١٤ يوم	في مرحلة ورقتين الى مرحلة الارباع الاوراق	١١٨,٢٩ مل - ٤٧٣,١٦ مل	القطن، دوار الشمس
٢١-١٤ يوم حتى مرحلة الحصاد	عند الازهار الاول	١١٨,٢٩ مل - ٩٤٦,٣٥ مل	افوكادو، ارضي شوكي، النعنع، الزيتون، الفول السوداني، التبغ

تحذير:

- الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها.

السمية للنبات :

غير ضار للنبات عند استعماله بالنسب الموصى بها وينصح بعمل تطبيق على مساحة صغيرة قبل ٣-٧ أيام من التطبيق على مساحة كبيرة للملاحظة اي اثار قد تظهر على النبات المعامل.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمدة وعند خلطه مع الاسمدة الفوسفاتية يجب التحريك بشكل جيد وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.