



نيكسيفلور (سائل للحقن)

التركيب : كل 1 مل يحتوي على :

فلورفينيكول 300 ملغم.
فلونيكسين ميغلومين 16.5 ملغم.

الاستعمالات:

علاج التهابات الجهاز التنفسي التي تسببها مانهيميا هيموليتيكا و باستوريلا مالتوسيدا و مايكوبلازما بوفيس و هيستوفيلاس سومناي المرتبطة بالحمى.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

- حقنة واحدة تحت الجلد.
- 2 مل / 15 كجم من وزن الجسم.
- يجب ألا يتجاوز حجم الجرعة المعطاة في أي موقع حقن واحد 10 مل.
- يوصى بمعالجة الحيوانات في المراحل المبكرة من المرض وتقييم الاستجابة للعلاج بعد 48 ساعة من الحقن.
- المضاد للالتهابات ، فلونيكسين ، قد يخفي الاستجابة البكتيرية الضعيفة للفلورفينيكول في الـ 24 ساعة الأولى بعد الحقن. إذا استمرت العلامات السريرية لأعراض الجهاز التنفسي أو ازدادت ، أو في حالة حدوث انتكاسة ، فيجب تغيير العلاج باستخدام مضاد حيوي آخر ، والاستمرار حتى تختفي العلامات السريرية.

التحذيرات:

- لا يستخدم في الثيران البالغة المخصصة للتكاثر.
- لا يستخدم في الحيوانات التي تعاني من أمراض الكبد والقلب والكلية.
- لا يستخدم إذا كان هناك خطر حدوث نزيف في الجهاز الهضمي أو في الحالات التي يوجد فيها دليل على تغير تخثر الدم.
- لا يستخدم في حالة وجود فرط حساسية للفلورفينيكول أو الفلونيكسين ميغلومين.
- يجب ألا يُعطى المنتج بالاقتران مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى أو الكورتيكوستيرويدات.

ISO 9001 & 14001 REGISTERED



DNV

MGMT. SYS.
RvA C:024

MGMT. SYS.
RvA C:425

DNV Certification B.V., The Netherlands

VAPCO

**VETERINARY & AGRICULTURAL
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



فترة سحب العلاج:

اللحوم ومشتقاتها: 46 يوماً.

الحليب: غير مصرح باستخدامه في إنتاج الحليب للحيوانات المرضعة للاستهلاك الآدمي.

التخزين:

يحفظ على درجة حرارة أقل من 30 م°.

يحفظ بعيداً عن اعين ومتناول الاطفال.

للاستعمال البيطري فقط