

فابرازول

منظم نمو نباتي

مركز معلم



منظم نمو نباتي في صورة مركز معلم يستخدم لزيادة النمو الثمري وتقليل النمو الجذري في الأشجار متساقطة الأوراق كأشجار العنبر الأحمر والتلخاح والأجاصن والخوخ والمشمش والبرقوق والمانجا، كما أن له فعالية ضد البياض الدقيقى والجرب في التلخاح والخوخ.

التركيب : كل لتر يحتوي على:

٤٥٪ (مادة فعالة) و / ح

باكلوبيريترازول

الخواص :

فابرازول : يقلل النمو الخضري في مختلف محاصيل الأشجار المثمرة كما هو محدد في جدول الاستعمالات.

فابرازول : يقلل من أطوال العقد الداخلية للبراعم الجديدة ويسبب تكويناً مبكراً للبراعم الطرفية.

فابرازول : يعمل على زيادة الانتاج من حيث اللون والحجم والكمية.

فابرازول : يقلل من اضرار الصقيع.

فابرازول : يقلل الحاجة إلى التقليم ويعلم على زيادة عقد الشمار.

فابرازول : يعمل على الوقاية من بعض الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيقى والتبعع والجرب.

الاستعمالات :

المحصول	طريقة الاستعمال	معدل الاستعمال	ملاحظات
التلخاخ	الرش	٣٥ - ٢٨ يوماً من بعد زراعة الرش متسلسل بـ ١-٥٠٠ مل / هكتار + مادة خافضة للتوتز السطحي غير آيونية.	- قم بالتطبيق في برنامج رش متسلسل ببدأ بعد ٣٥ - ٢٨ يوماً من الإزهار الكامل حسب نوع التلخاخ. - استخدم معدلاً أقل على الأشجار الأقل حيوية. - يمكن تطبيق الرشات اللاحقة بالجرعة الأقل بعد ٢١ يوماً مع التحكم في النمو المطلوب. - لا تستلزم أكثر من ٤ لتر / هكتار في الموسم الواحد. - تنبية: إذا تم استخدام المبيد (كارباريل) كرذاذ مخفف على التلخاخ أتركه لمدة ٢١ يوماً قبل تطبيق المنتج فابرازول.
الذراق، النكتارين، الدرادق	الري بالتنقيط، الغمر بالماء	٢ لتر / هكتار - ٤ لتر / هكتار	- يتم تطبيقه في أوائل الخريف أو في الربيع بعد ١٤ يوماً من ظهور البراعم والإزهار الكامل. - يوصى بالاستخدام في أواخر الصيف أو أوائل الخريف للأصناف مبكرة النضج. - اقسم المعدل لكل هكتار على عدد الأشجار لكل هكتار لتحديد المعدل لكل شجرة. - استخدم الجرعة الأعلى لأنواع التربة المتوسطة والثقيلة. - إعادة التطبيق: أعد التطبيق بمعدل ٢ لتر / هكتار (الري بالتنقيط) أو ٤-٢ لتر / هكتار (الغمر) في الموسم التالي. في التربة الخفيفة، أعد التطبيق عندما يستأنف النمو الطبيعي. - استخدم المعدل المنخفض لإعادة التطبيق للأصناف منخفضة النمو في المناطق الباردة.

المحصول	طريقة الاستعمال	معدل الاستعمال	ملاحظات
المشمش، البرقوق	الري بالتنقيط، الغمر بالماء	٢ لتر/ هكتار - ٤ لتر/ هكتار	- يتم تطبيقه في أوائل الخريف أو في الربيع بين ١٤ يوماً قبل ظهور البراعم والإزهار الكامل. - قد تقدم مواعيد الإزهار في البرقوق فيجب التأكد من معالجة الأشجار المقصبة في نفس الوقت لمنطقة الإزهار.
	الري بالتنقيط، الغمر بالماء	١ لتر/ هكتار - ٢ لتر/ هكتار	- قسم المعدل لكل هكتار على عدد الأشجار في البستان لكل هكتار لتحديد المعدل لكل شجرة. - استخدم جرعة الاستعمال الأعلى في أنواع التربة المتوسطة والثقيلة. - إعادة التطبيق: لا تعيد التطبيق حتى الموسم الذي يستأنف فيه النمو الطبيعي.
الكرز	الري بالتنقيط، الغمر بالماء	١ لتر/ هكتار	- التوكيد: التحكم في النمو: للتحكم في النمو من الأفضل أن يتم التطبيق عندما يكون النبات في مرحلة الإزهار الكامل. التحكم في سقوط الفاكهة: للمساعدة في الاحتفاظ بالثمار، يكون التطبيق أفضل عند عقد الثمار. - لا تستخدمنه عندما تكون الثمار الناضجة على الشجرة.
	الرش الورقي	٧ لتر/ لتر ١٠٠٠ لتر	- التحكم في النمو التحكم في سقوط الثمار
الأفوكادو	الاستعمال للشجرة الواحدة	٦ مل - ٨ مل	- يتم تطبيقه في غضون ٤ أيام بعد الحصاد أو في موعد لا يتجاوز منتصف فبراير. - يجب استخدام الجرعة الأعلى للأشجار الأقدم. - يجب سقي الأشجار جيداً قبل وبعد التطبيق. - نتبيه: لا تعامل الأشجار الصغيرة التي يقل قطرها عن ٣ أمتار. - إعادة التطبيق: قد تستمر آثار المنتج قابرازول على التزهير والنمو لأكثر من موسم واحد. - التربية الرملية: تأجيل التطبيق إلى ما بعد الحصاد بعد استئناف النمو الطبيعي. - الترب الطينية: يجب تقليل الاستعمال في كل موسم. إذا زاد انخفاض النمو تدريجياً من موسم لآخر، قم بتأجيل العلاج إلى ما بعد الحصاد بعد استئناف النمو الطبيعي.
	الغمر: الأشجار ٦-٣ سنوات: الترسب الرملية: الترسب الطينية: الأشجار التي يزيد عمرها عن ١ سنوات: الترسب الرملية: الترسب الطينية	١٦ - ٢٠ مل	- التربية الرملية: تأجيل التطبيق إلى ما بعد الحصاد بعد استئناف النمو الطبيعي.
المانجو	الاستعمال للشجرة الواحدة	٦ مل - ٨ مل	

تعليمات الاستعمال :

- عند إعادة زراعة بستان معالج بالمنتج فابرازول فإنه يجب أن تمر ٣ سنوات على الأقل من آخر تطبيق للمنتج فابرازول.
- عند زراعة الأشجار الصغيرة في بستان قائم تمت معالجته بالمنتج فابرازول عن طريق الغمر فإنه يجب إزالة التربية المعالجة واستبدالها بترية جديدة ويمكن الابتعاد عن منطقة التربية المغمورة سابقاً بالمنتج في الأشجار المزروعة سابقاً ووضع الأشجار الصغيرة بعيداً قدر الإمكان عن التربية المعالجة بمسافة (١,٥ متر على الأقل).
- في البساتين التي تمت معالجتها بغمر المنتج فابرازول، فيجب توفير تربة جديدة للسماح بتكوين الأشجار ونموها ويجب إزالة التربية المعالجة.
- يجب أن يبدأ استخدام فابرازول فقط عندما تقترب الأشجار من حجمها الأمثل، وهو مناسب أكثر للبساتين التي تتم إدارتها بشكل مختلف حيث تقترب الأشجار من ملئ المساحة المخصصة لها ويكون التحكم في النمو متطلباً أساسياً، ولا ينصح باستعماله للأشجار القديمة أو غير الصحيحة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع المبيدات المحتوية على المواد الفعالة (بوبيريمات، بروبراجيت، بيريميكارب، مانكوزيب) ومع ذلك، فإن خلط المنتج فابرازول مع أكثر من أي من هذه المبيدات قد يعطي نتائج غير متوقعة أو قد يؤدي إلى تلف المحاصيل.

طريقة الخلط :

(١) طريقة الغمر:

- امزج الكمية المطلوبة من المنتج فابرازول مع الكمية الموصى بها من الماء مع التحريك المستمر لمنع ترسب المنتج.
- يكون امتصاص المنتج فابرازول أكثر كفاءة عند تطبيقه على التربة التي تحتوي على كمية كافية من الماء وحيث توجد كثافة عالية من الجذور المغذية.

- ضع الكمية المطلوبة من المنتج فابرازول في ٥٠ لتر من الماء لكل شجرة على خط صدع التربة/الجذع بالتساوي حول قاعدة الجذع. عندما لا يتم تحديد معدلات محددة لكل شجرة، يتم تحديد معدل الاستخدام لكل شجرة عن طريق قسمة معدل الاستخدام لكل هكتار على عدد الأشجار لكل هكتار.

- يجب استخدام الجرعة الأعلى للأشجار الكبيرة والتأكد من أن الأشجار مروبة بشكل كاف بعد معالجتها في ظل الظروف الجافة.

- يجب ترك الأشجار الفردية، التي تكون أصغر من المتوسط، دون علاج أو إعطاء جرعة أصغر نسبياً من المنتج فابرازول.

(٢) طريقة الرش الورقي:

- أضف الكمية المطلوبة من المنتج فابرازول إلى دلو نظيف من الماء وحركه للحصول على مزيج مجandas، كما يمكن استخدام المواد الخاضفة للتلوث السطحي غير الآيونية و يجب التحريك أثناء اكمال التعبئة.

- يوصى بالتحريك المتكرر أو المستمر للخلط. اغسل خزان الرش جيداً بعد الاستخدام.

- يتم تطبيق فابرازول بكمية كافية من الماء ضمن اختراق الرش والتقطيعية الجيدة للأنسجة المستهدفة والأنسجة الجذعية الخضراء الجديدة في حالة التقاح. يتم تطبيقه بكمية لا تقل عن ١٠٠ لتر من الماء لكل هكتار.

- ليس من الضروري إعادة تطبيق المنتج إذا حدث هطول أمطار بعد وقت قصير من الاستخدام.

- للحصول على أفضل النتائج، طبق الرش الورقي بعد غروب الشمس.

(٣) الري بالتنقيط :

- يمكن تطبيق الكمية المطلوبة من المنتج فابرازول من خلال نظام الري بالتنقيط.

- يعد التوزيع المتساوي للمياه بين الأشجار أمراً ضرورياً لهذه الطريقة لإعطاء تأثير موحد.

تحذيرات :

- يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها.

- إذا كانت الشجرة تحت الاجهاد فلا ينبغي استخدام المنتج فابرازول.

- يمكن أن يكون سبب الاجهاد كالتالي:

- ١- نقص الرطوبة بسبب قلة الأمطار أو عدم كفاية الري.

- ٢- الصقيع الشديد أو المتأتلي.

- ٣- الملوحة

- ٤- درجة الحرارة العالية.

- ٥- الرطوبة الزائدة بسبب الري غير المناسب أو غيره.

- ٦- ضعف الخصوبة الناتج عن عدم توافر العناصر الغذائية الكبرى أو الثانوية، الأمراض، الحشرات، الاستخدام غير المناسب لمبيدات الأعشاب، الأضرار الميكانيكية.

- ٧- لا يستخدم في البساتين المزروعة مع أي محاصيل أخرى.

- ٨- لا يطبق على الأشجار الصغيرة التي تم زراعتها مؤخراً في البساتين والتي تكون مطلوبة لتحقيق النمو النشيط والحيوي.

- ٩- يفضل الرش على الأوراق لسرعة تجاوب الأشجار.

- ١٠- قد تنتج الأشجار المعاملة التumar بشكل كبير والذي يتطلب مستوى أعلى من استخدام الأسمدة.

- ١١- في بعض الحالات، قد تنتج الأشجار المعاملة فواكه زائدة وينبغي إيلاء اهتمام دقيق لعمليات التخفيض.