



فيبروفاب

التركيب: يحتوي كل مل على:

10 ملغم

فيبرونيل

الاستطبابات:

العلاج والسيطرة على ذبابة ذات القرن ، القراد، القمليات العاضة و الماصة و النغف. علاج ومكافحة الطفيليات الخارجية التالية للماشية والأغنام والإبل والخيول وخنزير غينيا: القراد (بوفيلوس مايكروبلص)، ذبابة ذات القرن (هيموتوبيا اريتانس) القمل العارض (دامالينا بوفس) القمل الماص (لينوجانثاس فيتولي) و داء النغف العقدي (ديرماتوبيا هومينيس) و الذباب (ميلوفاجس اوفينوس).

الجرعات و طريقة الاستعمال:

يستعمل بشكل موضعي (صب).

- الأبقار، الاغنام، الجمال و الخيول: الجرعة الموصى بها: 1 مل لكل 10 كغ وزن جسم (بما يعادل 1 ملغم مادة فعالة لكل 1 كغ وزن جسم).
- خنازير غينيا: 0.1 مل لكل كغ وزن جسم (بما يعادل 1 ملغم مادة فعالة لكل 1 كغ وزن جسم). والتي في الحقل تعادل قطرتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم ، توضع على ظهر الحيوان.
- يمكن أن تكون فترة العلاج كل شهرين على الأقل ، تعتمد على شدة الإصابة والطقس وظروف الإدارة في القطيع. استشر الطبيب البيطري لتحديد الفترة الأفضل للعلاج.

فترة الامان:

- اللحوم: 100 يوم.
- لا تستعمل في الأبقار المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري.
- لا تستخدم في الأبقار أو العجول الحامل ، المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري ، خلال 3 أشهر من الولادة المتوقعة.

تحذيرات:

- للاستعمال الخارجي فقط.
- لا يستخدم بطريقة استعمال اخرى.
- لا يوضع المنتج على الجلد المصاب.
- يتم وضع المستحضر على الحيوان في منطقة جيدة التهوية.
- لا يتم استعماله على الحيوانات المريضة والضعيفة.

التخزين:

- يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال و الطعام و الشراب.
- يتم تخزينه بمكان جاف و معتم، بدرجة حرارة اقل من 30 درجة مئوية.

للاستعمال البيطري فقط.