



فوكسيقاب

مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

فوكسيم 500 غم

الاستطبابات:

يستعمل لعلاج النغف والجرب والإصابة بالقراد والقمل و العث في الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الرش أو التغطيس أو الغسل، بعد التخفيف بالماء كما يلي:

الخيول	الابقار	الاعنام و الماعز	
الجرب:			
1 مل في لتر ماء (بأستخدام الاسفنج)	1 لتر في 1000 لتر ماء. الجرب القديم: 1 لتر في 500 لتر ماء.	1 لتر في 2000 لتر ماء. الجرب القديم: 1 لتر في 1000 لتر ماء.	الجرعة
النغف، القراد، القمل و العث:			
1 مل في لتر ماء (بأستخدام الاسفنج)	1 لتر في 1000 لتر ماء.	1 لتر في 2000 لتر ماء.	الجرعة

- **التعويض:** عند انخفاض حجم الماء بنسبة 20%، يعاد ملؤه بمحلول 250 مل من المستحضر في 125 لتر ماء. يمكن إعادة ملؤه في أول 3 أيام و تجديده بالكامل في اليوم الخامس.

- **فترة الامان:**

الابقار: اللحوم و احشائها: 40 يوم.
الحليب: لا يستعمل للابقار المرضعة، المنتجه للحليب للاستهلاك البشري و في فترة التنشيف.

الاعنام، الماعز و الخيول:

اللحوم و احشائها: 28 يوم.
الحليب: لا يستعمل للحيوانات المرضعة، المنتجه للحليب للاستهلاك البشري و في فترة التنشيف.

تحذيرات:

لا تستخدم الدواء قبل وبعد 10 أيام من تناول مثبطات الكولينستريز الأخرى ، الفينوثيرازين أو مرخيات العضلات. لا يستخدم بالتزامن مع التخدير العام.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف و معتم و بدرجة حرارة اقل من 30°م.

للاستخدام البيطري فقط.