



فيرمكتين 2%

(سائل للحقن)

التركيب: كل مل يحتوي على:

20 ملغم ايفرمكتين

الخصائص:

يُستق الإيفرمكتين من أفرمكتين، وهي عائلة مضادة للطفيليات واسعة النطاق القوية والتي يتم عزلها من تخمير الستربتوميسيس أفرميتيليس. وهو مضاد للديدان الخيطية والطفيليات الخارجية قوي للغاية عن طريق الفم أو بالحقن، ولكن ليس له أي نشاط ضد الديدان الكبدية. يتمتع الإيفرمكتين بهامش أمان مقبول، والجرعة المطلوبة صغيرة جدًا ويستمر نشاطه لفترة طويلة بعد اعطاءه.

الاستطابات:

للعلاج والسيطرة الفعالة على الطفيليات الداخلية والخارجية للأبقار والأغنام والجمال (مثل الديدان الأسطوانية المعوية، وديدان الرئة، والقمل الماص والعض، ويرقات الأبقار، وعتث الجرب).

الجرعات:

ينبغي أن تعطى فقط عن طريق الحقن تحت الجلد.
الجرعة: 1 مل / 100 كغم من وزن الجسم.

فترة سحب العلاج:

لاستهلاك اللحوم: الأبقار، الأغنام: 21 يوماً
الجمال: 28 يوماً
لاستهلاك الحليب: 28 يوم

التحذيرات:

لا يُستخدم في الحيوانات المنتجة للحليب للاستهلاك البشري، ولا يستخدم في الأغنام الحلوب أو خلال 21 يوماً قبل الحمل بحيث يتم استخدام الحليب للاستهلاك البشري.
ولا يُستخدم علاج الجمال المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.

التخزين:

- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

للاستعمال البيطري فقط